

ತರಗತಿ X

ಗಣಿತ

MATHEMATICS

ಭಾಗ - 2

Part - 2



ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಮಿತಿ (SCERT), ಕೇರಳ

2016

ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ

ಜನಗಣ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯಹೇ
ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ
ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ ಮರಾಠಾ
ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ವಂಗ
ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ
ಉಚ್ಛಲ ಜಲಧಿತರಂಗ
ತವಶುಭ ನಾಮೇ ಜಾಗೇ
ತವಶುಭ ಆಶಿಷ ಮಾಗೇ
ಗಾಹೇ ತವ ಜಯ ಗಾಥಾ
ಜನಗಣ ಮಂಗಲದಾಯಕ ಜಯಹೇ
ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ
ಜಯಹೇ ಜಯಹೇ ಜಯಹೇ
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯಹೇ

ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ

ಭಾರತವು ನನ್ನ ದೇಶ. ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರ,
ಸಹೋದರಿಯರು.

ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಸಂಪನ್ನ ಹಾಗೂ
ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ.

ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಗುರುಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು
ಮುಡಿಪಾಗಿಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆನಂದವಿದೆ.

Prepared by :

State Council of Educational Research and Training (SCERT)

Poojappura, Thiruvananthapuram 695 012, Kerala

Website : www.scertkerala.gov.in

E-mail : scertkerala@gmail.com

Phone : 0471-2341883, Fax : 0471-2341869

Typesetting and Layout : SCERT

Printed at : KBPS, Kakkanad, Kochi-30

© Department of Education, Government of Kerala



ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ,

ಎಣಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಳತೆಗಳಿಂದಲೂ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಿಗೆ ಗಣಿತವು ಅರಂಭವಾಗುವುದು. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದ್ವಿಮಾನ ಸಮವಾಕ್ಯಗಳಾಗುವುವು; ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರುವುದು. ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ ಎಂಬ ಗಣಿತ ಶಾಖೆಯಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುವುದು. ನವೋತ್ಥಾನ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ನಾವಿಕ ಸಂಚಾರಗಳ ಅಡಿಪಾಯವಾಗುವುದು; ಇಂದಿನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ಸ್ಥಾನನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅಧಾರವಾಗಿರುವುದು. ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇ-ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಗಣಿತದ ಅನಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ತಾಳಗಳನ್ನು ಅನಂದಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಹಾರೈಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ಡಾ| ಪಿ.ಎ. ಫಾತಿಮಾ
ಡೈರೆಕ್ಟರ್
ಎಸ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ

TEXT BOOK DEVELOPMENT COMMITTEE

Participants

T.P Prakashan

G.H.S.S Vazakkad
Malappuram

Unnikrishnan.M.V

G.H.S.S Kumbala
Kasaragod

Vijaya Kumar T.K

G.H.S.S Cherkala
Kasaragod

Ramanujam R

M.L.K.M.G.H.S.S
Palakkad, Poolapatta

Anil kumar M.K

S.K.M.J.H.S.S
Kalpetta, Wayanad

Ubaidulla K.C

S.O.H.S.S Arikkad
Malappuram

Ramesh N.K

R.G.M.H.S.S Mokeri, Kannur

Jabir.K

G.V.H.S Mogral, Kasaragod

Shrikumar .T

G.G.H.S.S Karamana
Thiruvananthapuram.

K.J Prakash

G.M.G.H.S.S Pattam
Thiruvananthapuram.

C.P.A Kareem

S.O.H.S.S Arikkad
Malappuram

Mohammadali P.P

G.M.H.S.S Calicut
University Campus, Malappuram

P.P Prabhakaran

Rtd. Teacher
Prashanth, Poonoor, Kozikkod

Cover:

Rajeevan N.T

G.H.S.S Thariod, Wayanad



Experts

Dr. E. Krishnan

Rtd. Prof University College
Thiruvananthapuram

Dr. Ramesh Kumar P

Asst. Prof. Kerala University.

Venugopal .C

Asst. Prof, Govt. College of
Teacher Education,
Thiruvananthapuram

Dr. Sharachandran

Rtd. Dy. Director of collegiate
Education Kottayam

Participants (Kannada Version)

Krishna Prakash S.

S.N.H.S. Perla

Balakrishna P.

B.E.M.H.S.S. Kasaragod

Harsha Kumar M.

S.G.K.H.S. Kudlu

Raghava A.

G.H.S.S. Bellur

Rajeshchandra K.P.

B.E.M.H.S.S. Kasaragod

Prapullachandra C.H.

G.H.S.S. Adoor

Language Expert

Shridhara N.

Asst. Prof. Govt. College
Kasaragod.

Co-ordinator

Dr. Faizal Mavulladathil

Research Officer, SCERT, Thiruvananthapuram

Academic Co-ordinator

Sujith Kumar G.

Research Officer, SCERT, Thiruvananthapuram



State Council of Educational Research and Training (SCERT)

Vidyabhavan, Pujappura, Thiruvananthapuram - 695 012


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ



7. ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು 159
8. ಘನಾಕೃತಿಗಳು 189
9. ಜ್ಯಾಮಿತಿಯೂ ಬೀಜಗಣಿತವೂ 213
10. ಬಹುಪದಗಳು 233
11. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 247



ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು
ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ.



ICT . ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು



ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಸೋಡಿರಿ



ಸಂಶೋಧನೆ



ಪುನರವಲೋಕನ




ಚರ್ಚಿಸುವ

ಸ್ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು

7


ಗೆರೆಯೂ ವೃತ್ತವೂ


ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:




ವೃತ್ತದ A ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕವಿರುವ ವ್ಯಾಸವು AB ಆಗಿದೆ; ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವ್ಯಾಸದ ಬದಲಾಗಿ Aಯ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಯಾವನ್ನು ಎಳೆದು ಇದರಂತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವು ಸಿಗುವುದು.






Aಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ, Xನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ Aಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತರುವುದಾದರೋ?



ಜಿಯೋಜಿಬ್ರದಲ್ಲಿ O ಎಂಬ ಬಿಂದುವು ಕೇಂದ್ರವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ A, X ಎಂಬಂತೆ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ. O, A ಎಂಬೀ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು A, X ಎಂಬೀ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. X ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು A ಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ AX ಎಂಬ ಗೆರೆಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದು? X ಎಂಬ ಬಿಂದು A ಗೆ ತಲುಪುವಾಗಲೋ? O, X ಇವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರಿ. X ನ ಸ್ಥಾನ A ಗೆ ತಲುಪುವಾಗ OAX, AOX ಎಂಬೀ ಕೋನಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂದು ನೋಡಿರಿ.


ಹೀಗೆ Xನ್ನು ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ Aಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೋ?



ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುಗೆರೆಯು ವೃತ್ತವನ್ನು Aಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಅಲ್ಲವೆ?


ಈ ಗೆರೆಯನ್ನು ವೃತ್ತದ A ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆ (tangent) ಎಂದು ಹೇಳುವುದು. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿರಿ. ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ?


ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು, AX ಎಂಬ ಜ್ಯಾದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ x° ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.




$\sqrt{2}$
 $\sqrt{3}$
 $\sqrt{5}$
 $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 $\frac{1}{7}$
 $\frac{1}{3}$
 $\frac{1}{10}$
 $x^2 - a^2$
 $(0, 1)$

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 $an + b$






X ಎಂಬ ಬಿಂದುವು A ಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ AX ಎಂಬ ಜ್ಯಾದ ಉದ್ದವೂ ಅದರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನವೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗುವುದು; ಅಂದರೆ x ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆಯವರೆಗೆ ತಲುಪುವುದು.



ಜ್ಯಾ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಇವುಗಳೊಳಗಿನ ಕೋನವೂ? AOX ಸಮಪಾರ್ಶ್ವ ತ್ರಿಕೋನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕೋನ $\frac{1}{2}(180 - x) = (90 - \frac{1}{2}x)$ ಆಗಿದೆ.






ಚಲಿಸುವ ಗೆರೆಗಳು

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ: ಒಂದು ವೃತ್ತ, ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕವಿರುವ ಒಂದು ಗೆರೆ. ಗೆರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೇ? ಗೆರೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಸರಿಸಿದಾಗ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿನ ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಗೆರೆಗೆ ತಲುಪುವುದಲ್ಲವೆ? ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಿಂದುವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆ ಈ ಸಮಾನಾಂತರ ಗೆರೆಗಳಿಗೆ ಲಂಬವಾಗುವುದಲ್ಲವೆ.

X ಎಂಬ ಬಿಂದು, A ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಈ ಕೋನ 90° ಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಸ್ವರ್ಣರೇಖೆಯಾಗುವಾಗ, ನಿಖರವಾಗಿ 90° ಆಗುವುದು.

ಜಿಯೋಜಿಬ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ. ತ್ರಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಲಂಬವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಈ ಬಿಂದುವು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ತಲುಪುವಾಗ ಗೆರೆಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದು?





ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.


ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕವಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶ ರೇಖೆ, ಆ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕವಿರುವ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವುದು.



ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರದಲ್ಲಿ Tangents ನ್ನು ತೆಗೆದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಬಿಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆ ಲಭಿಸುವುದಲ್ಲವೆ. ವೃತ್ತದ ಹೊರಗಿದ್ದರೇ?



ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಅದರ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆ ಎಳೆದು ಅದರ Trace on ನೀಡಿರಿ. ಸ್ಪರ್ಶ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದ ಬಿಂದುವಿಗೆ Animation ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿರಿ.

ಇದನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ; ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಗೆರೆ ವೃತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯಾಗಿದೆ.



ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಟುಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬಹುದೇ?


ಮೊದಲು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ತ್ರಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ. ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.



$\sqrt{2}$
 $\sqrt{3}$
 $\sqrt{5}$
 $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 $\frac{1}{7}$
 $\frac{1}{3}$
 $\frac{1}{10}$
 $x^2 - d^2$
 $(0, 1)$

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
 $an + b$


$$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$



ಇನ್ನು ವೃತ್ತದ ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ವರ್ಶರೇಖೆ ಎಳೆಯಬೇಕು? ಅದು ಮೊದಲಿನ ಗೆರೆಯನ್ನು 25° ಬಾಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ.

ಮೊದಲಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನದ ಮೇಲಿನ ಕೋನ ಲಂಬಕೋನ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕೋನವು 25° ಆಗಿವೆ.



ಆಗ ಮೂರನೇ ಕೋನ 65° .



ಇನ್ನು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ.




- (1) ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಶರೇಖೆ, ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆರೆ, ಇವುಗಳು ಸೇರಿರುವ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.




ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಟು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರಿ.

- (2) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಮಚತುರ್ಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ಭುಜಗಳು ವೃತ್ತದ ಸ್ವರ್ಶರೇಖೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಟು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರಿ.






- (3) ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಎರಡು ವ್ಯಾಸಗಳ ಅಗ್ರಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು ಸೇರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚತುರ್ಭುಜ ಉಂಟಾಗುವುದು?
- (4) ಒಂದು ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸದ ಅಗ್ರಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.


ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳೂ ಕೋನಗಳೂ

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:



O ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ A, B ಎಂಬೀ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು, C ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವುದು.


OACB ಎಂಬ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ A, B ಎಂಬೀ ವಿರುದ್ಧ ಶಿರಕೋನಗಳು ಲಂಬ ಕೋನಗಳಾಗಿವೆ; ಆದುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ 180°. ಆಗ ಈ ಚತುರ್ಭುಜವು ಚಕ್ರೀಯವಾಗಿದೆ.



ಅಂದರೆ,

ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ, ಅದರ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು, ಈ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಬಿಂದು, ಇವುಗಳು ಶಿರಗಳಾಗಿರುವ ಚತುರ್ಭುಜವು ಚಕ್ರೀಯವಾಗಿದೆ.


ಈ ರೀತಿಯ ಚತುರ್ಭುಜದ ಉಳಿದ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತವೂ 180° ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ.



ಹೆಸರಿನ ವಿವರ

ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥವಿರುವ tangere ಎಂಬ ಲಾಟಿನ್ ಶಬ್ದದಿಂದಾಗಿದೆ, ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ tangent ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವುದು. ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ tan ಎಂಬ ಅಳತೆಯ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು tangent ಎಂದಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆ ಯೊಂದಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವೇನು?


ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.



ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ 1 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, PT ಎಂಬ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯ ಉದ್ದ tan x ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ?



$$\frac{\pi + \sqrt{5}}{2}$$




ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು

ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.


ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಸೇರುವ ಕೋನ ಮತ್ತು ಈ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು ಸೇರುವ ಕೋನ, ಇವುಗಳು ಪರಿಪೂರಕವಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ ರಚಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಭುಜ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು.




ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ವೃತ್ತ


ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಆರು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಮಾಡಿದರೋ?




ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, 90 ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ರಚಿಸಲಾದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ:




ತ್ರಿಕೋನದ ಭುಜಗಳನ್ನು ವೃತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲವೇ. ತ್ರಿಕೋನವು ಸಮಭುಜ ತ್ರಿಕೋನವಾದುದರಿಂದ, ಇವುಗಳು ಸೇರುವಲ್ಲಿನ ಕೋನ 60° ಆಗಿದೆ.

ಇವುಗಳು ವೃತ್ತವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಸೇರುವ ಕೋನವೆ?



ಇದರಂತೆ, ತ್ರಿಕೋನದ ಭುಜಗಳು ವೃತ್ತವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನಗಳೆಲ್ಲಾ 120° ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಕಾಣುವುದು.



$$\sqrt{2}$$

$$\sqrt{3}$$

$$\sqrt{5}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$


$$\frac{1}{7}$$


$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{10}$$

$$x^2 - a^2$$

$$(0, 1)$$








ಆಗ, ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 120° ಎಡೆಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಅವುಗಳ ತುದಿ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತ್ರಿಕೋನ ಸಿಗುವುದು. 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಭುಜ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ.







- (1) ತ್ರಿಜ್ಯ 2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕೋನಗಳು $40^\circ, 60^\circ, 80^\circ$ ಆಗಿರುವ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ.
- (2) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ (ನೀಲ) ತ್ರಿಕೋನವು ಸಮಭುಜ ತ್ರಿಕೋನವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಶಿರಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ಪರಿವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು ದೊಡ್ಡ (ಕೆಂಪು) ತ್ರಿಕೋನದ ಭುಜಗಳಾಗಿವೆ.
 - i) ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಕೋನವು ಸಮಭುಜ ತ್ರಿಕೋನವೆಂದೂ ಅದರ ಭುಜಗಳು ಸಣ್ಣ ತ್ರಿಕೋನದ ಭುಜಗಳ ಅಳತೆಗಳ ಎರಡು ಮಡಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಸಾಧಿಸಿರಿ.
 - ii) ಸಣ್ಣ ತ್ರಿಕೋನದ ಭುಜಗಳ ಅಳತೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ.
 - iii) ಸಮಭುಜ ತ್ರಿಕೋನದ ಬದಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಕೋನದ ಶಿರಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ಪರಿವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದರೆ ಭುಜಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಎರಡು ಮಡಿಯಾಗಿರುವ ಸದೃಶ ತ್ರಿಕೋನವು ಸಿಗುವುದೇ? ಸಮರ್ಥಿಸಿರಿ?
- (3) ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳನ್ನೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳನ್ನೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವುದು.



- i) ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳ ಉದ್ದಗಳು ಸಮಾನವೆಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.
- ii) ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು ಸೇರುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯು, ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ಎಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋನದ ಸಮಭಾಜಕವೆಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.




$$\frac{\pi + \sqrt{5}}{2}$$




ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು

iii) ಈ ಗೆರೆಯು, ಸ್ಪರ್ಶಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಜ್ಯಾದ ಲಂಬ ಸಮಭಾಜಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.




(4) ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಜ್ಯಾಗಳ ಅಗ್ರಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು ಭುಜಗಳಾಗಿರುವ ಚತುರ್ಭುಜವು ಚಕ್ರೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯಾವು ವ್ಯಾಸವಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚತುರ್ಭುಜವು ಸಿಗುವುದು? ಎರಡೂ ಜ್ಯಾಗಳು ವ್ಯಾಸಗಳಾದರೋ?




ಜ್ಯಾವೂ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯೂ

ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯಾದ ಎರಡು ತುದಿಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವುದು.




ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು ಸೇರುವ ಕೋನವು 80° ಆಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಜ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳೊಳಗಿನ ಕೋನವೋ?




$$\frac{1}{7}, \frac{1}{3}, \frac{1}{10}$$

$$x^2 - a^2$$


$$(0, 1)$$






ಗಣಿತ x

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತ್ರಿಕೋನದ ಎರಡು ಭುಜಗಳು ಸಮಾನವಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಎದುರಿರುವ ಕೋನಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ $180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$ ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋನ 40° ಆಗಿರುವುದು.



ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳೊಳಗಿನ ಕೋನ 90° ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ; ಆಗ ಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳೊಳಗಿನ ಕೋನ $90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$




ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ

ಕೆಳಗಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹಸಿರು ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ?

ಇದು, ಚಾಪದ ಕೇಂದ್ರೀಯಕೋನದ ಅರ್ಧವಲ್ಲವೆ?

ಯಾವುದೇ ಚಾಪಕ್ಕೂ ಇದು ಸರಿಯಾಗುವುದೇ? ಇದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಲು, ಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ x° ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡುವ.



$\sqrt{2}$

$\sqrt{3}$

$\sqrt{5}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\frac{1}{7}$


$\frac{1}{3}$

$\frac{1}{10}$



$x^2 - a^2$

(0, 1)





$an + b$

ಆಗ ಹಸಿರು ತ್ರಿಕೋನದ ಇತರ ಎರಡು ಕೋನಗಳು

$$\frac{1}{2}(180 - x)^\circ = \left(90 - \frac{1}{2}x\right)^\circ$$


ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆ ಮತ್ತು ತ್ರಿಜ್ಯ ಇವುಗಳೊಳಗಿನ ಕೋನವು 90° ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಗಳೊಳಗಿನ ಕೋನವು $\frac{1}{2}x^\circ$ ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದಲ್ಲವೇ?



ಜಿಯೋಜಬ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯಾವನ್ನೂ ಅದರ ತುದಿಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳನ್ನೂ ಎಳೆಯಿರಿ. ಜ್ಯಾದ ಕೇಂದ್ರೀಯಕೋನವನ್ನೂ, ಜ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆ ಇವುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಕೋನವನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿರಿ. ಈ ಕೋನಗಳೊಳಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವೇನು? ಹಲವು ಜ್ಯಾಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ನೋಡಿರಿ.




ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಜ್ಯಾದ ಎರಡು ತುದಿ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು ಜ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೋನವು, ಜ್ಯಾದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನದ ಅರ್ಧವಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾವು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೋನವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನದ ಅರ್ಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ.




$$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

ಗಣಿತ X




ಬದಲಾಗದ ಕೋನ


ಒಂದೇ ವೃತ್ತಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೋನಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿವೆಯೆಂದು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲವೇ:



PB ಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿಸಿ:




ಇನ್ನು P ಯನ್ನು ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಸಿ, B ಯನ್ನು ತಲುಪಿದರೋ?




XY ಎಂಬ ಗೆರೆ B ಯ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಕೋನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.


ಆಗ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು ಜ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೋನವು ಎಷ್ಟಾಗಿರುವುದು?



ಬಲಭಾಗದ ಕೋನಗಳು 65ಯೇ ಆಗಿದೆ.



ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕೋನಗಳು $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$. ಇದು ವೃತ್ತದ ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾವು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೋನವೇ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ?




ಆಗ, ಜ್ಯಾವು ಅದರ ತುದಿಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೋನಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತದಲ್ಲುಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳು ಇವುಗಳೊಳಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ ತೋರಿಸಬಹುದು.

$\sqrt{2}$
 $\sqrt{3}$
 $\sqrt{5}$
 $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 $\frac{1}{7}$
 $\frac{3}{11}$
 $\frac{1}{10}$



9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

$$x^2 - a^2$$

(0, 1)




$$an + b$$




ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲೂ ಬಹುದು.

ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಜ್ಯಾವು ಅದರ ತುದಿಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೋನವು, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.


ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯುವುದೆಂದರೆ ಈ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕವಿರುವ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಲಂಬವನ್ನು ಎಳೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರವು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ತತ್ವವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಜ್ಯಾವನ್ನು ಎಳೆದು ಅದು ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೋನವನ್ನು ಜ್ಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.




ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ಸಮಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿ ರಚಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ಭುಜಕ್ಕೆ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದು.




ಆಗ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಯಾವುದಾದರೂ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಲು, ಮೊದಲು ಈ ಬಿಂದುವು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಚಾಪ ರಚಿಸಿ, ಅದು ಮೊದಲಿನ ವೃತ್ತವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು.






ಬದಲಾಗುವ ಕೋನಗಳು


ಮರುವೃತ್ತಖಂಡದ ಕೋನಗಳು ಪರಿಪೂರಕವಾಗಿವೆಯಲ್ಲವೇ:




ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದಂತೆ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಳೆಯಿರಿ.




P ಯನ್ನು ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ Q ವಿನ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ?




AP ಯ ಕೆಳಗೆ x° ಯೂ ಮೇಲೆ $(180-x)^\circ$ ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಚಲನೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಳತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ?



ಇನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕಾದ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ, ಈ ಗೆರೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದರೆ ಸಾಕು.



(1) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ತ್ರಿಕೋನದ ಶಿರಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ಪರಿವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಕೋನದ ಭುಜಗಳಾಗಿವೆ.




ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಕೋನದ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರಿ.


Decorative vertical text on the left margin: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\frac{1}{\sqrt{5}}$, $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{10}$, $x^2 - a^2$

Decorative vertical text on the right margin: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

(0, 1)




$$\frac{\pi + \sqrt{5}}{2}$$




(2) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ತ್ರಿಕೋನದ ಶಿರಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ಪರಿವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ವರ್ಶರೇಖೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಕೋನದ ಭುಜಗಳಾಗಿವೆ.

ಚಿಕ್ಕ ತ್ರಿಕೋನದ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.




(3) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ABC ಎಂಬ ತ್ರಿಕೋನದ ಶಿರಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ಪರಿವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ವರ್ಶರೇಖೆಗಳು PQ, RS, TU ಎಂಬೀ ಗೆರೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಮಾನ ಕೋನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.




(4) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಪಂಚಭುಜದ ಒಂದು ಶಿರದ ಮೂಲಕ ಅದರ ಪರಿವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಶರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ವರ್ಶರೇಖೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಶಬಿಂದುವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಪಂಚಭುಜದ ಭುಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸ್ವರ್ಶರೇಖೆ

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.



ವೃತ್ತದ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದು ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸದ ಅಗ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ.

ವೃತ್ತದ ಹೊರಗಿನ ಇದೇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ, ವೃತ್ತದ ಒಳಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆಯೇ ಕೆಳಗೋ ಒಂದೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಎಳೆದರೋ?

$$\sqrt{2}$$

$$\sqrt{3}$$

$$\sqrt{5}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$


$$\frac{1}{7}$$

$$\frac{1}{3}$$


$$\frac{1}{10}$$

$$x^2 - a^2$$

$$(0, 1)$$



$$an + b$$



$$\sqrt{2}$$

$$\sqrt{3}$$

$$\sqrt{5}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{7}$$

$$\frac{1}{3}$$


$$\frac{1}{10}$$




$$x^2 - a^2$$

$$(0, 1)$$


ಗಣಿತ x



ಗೆರೆಗಳು ವೃತ್ತವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಬಿಂದುಗಳು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೋ?




ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತವನ್ನು ಛೇದಿಸಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಗೆರೆಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ಹಂತದ ನಂತರ ವೃತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ, ಮೇಲೆಯೂ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೂ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳು ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದಲ್ಲವೆ?




ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಹೊರಗಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು

ಎಳೆಯಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಳೆಯಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲವೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.




9
8
7
6
5
4
3
2
1
0




ತ್ರಿಜ್ಯ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಳೆದರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದೆಂದು ಅಲೋಚಿಸಿದರೆ, ಎಳೆಯಬೇಕಾದ ವಿಧಾನವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿದು ಬರಬಹುದು.




ಹೊರಗಿರುವ ಬಿಂದುವಿನಿಂದಲೂ, ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಜೊತೆ ಗೆರೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು.

ಹೀಗೆ ರಚಿಸುವ ಲಂಬ ಜೋಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಧಿಸುವುದು ಹೊರಗಿನ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯೂ ವ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೃತ್ತಗಳು ಎಂಬ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವಲ್ಲವೆ.





ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲಂಬಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆಯು ಮೊದಲ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಗೆರೆಗಳು ಸಂಧಿಸುವುದು ಮೊದಲ ವೃತ್ತದಲ್ಲಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ವೃತ್ತವು, ನಂತರದ ವೃತ್ತವನ್ನು ಛೇದಿಸಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಿದರೆ ಸಾಕಲ್ಲವೆ?

ಇನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದಲ್ಲವೆ: ಮೊದಲು, ಹೊರಗಿನ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯು ವ್ಯಾಸವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ.




O ಎಂಬ ಬಿಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಜಿಯೋಜಿಬ್ಬದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ A, B ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ. ಈ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅವುಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಬಿಂದು C ಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ. ಚತುರ್ಭುಜ OACB ಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಇದು ಚಕ್ರೀಯವಾಗಿದೆಯೇ? Circle through Three Points ಉಪಯೋಗಿಸಿ O, A, B ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. A, B ಇವುಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಇವುಗಳು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ C ಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದು? ದೂರ ಸರಿಯುವಾಗಲೋ? ಈ ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದು ವ್ಯಾಸದ ಅಗ್ರಬಿಂದುಗಳಾಗುವಾಗ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದು?






ಈ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ವೃತ್ತ ಪರಸ್ಪರ ಖಂಡಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಬಿಂದುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು ಸಿಗುವುವು.



ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದಲ್ಲವೆ.




ಆಗ, ಪೈಥಗೋರಸನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ, ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

$$\sqrt{5^2 - 2^2} = \sqrt{21} \text{ ಸೆ.ಮೀ}$$

ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದಾಗ, ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಸಂಧಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯ ಉದ್ದವು ಸಮಾನವೆಂದು ಈ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಬಹುದು.

ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಉದ್ದವಿರುವುದು.

ಇದನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು ಭುಜಗಳಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.




ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಈ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರೆ?

$\sqrt{2}$
 $\sqrt{3}$
 $\sqrt{5}$
 $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 $\frac{1}{7}$
 $\frac{1}{3}$
 $\frac{1}{10}$


9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

$x^2 - a^2$

(0, 1)




$$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$



ಸ್ವರ್ಶರೇಖೆಗಳು

ಶಿರಗಳಿಂದ ಇರುವ ಸ್ವರ್ಶರೇಖೆಗಳ ಉದ್ದಗಳು a, b, c, d ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.



ಆಗ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕೆಳಗಿನ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಭುಜಗಳ ಉದ್ದವು $(a+b) + (c+d)$. ಎಡಕ್ಕೂ ಬಲಕ್ಕೂ ಇರುವ ಭುಜಗಳ ಅಳತೆಗಳ ಮೊತ್ತವು?


$(a+d) + (b+c)$ ಎರಡೂ ಮೊತ್ತವೂ $a+b+c+d$ ಯೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ

ಒಂದು ವೃತ್ತದ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕವಿರುವ ಸ್ವರ್ಶರೇಖೆಗಳು ಸೇರಿ ಉಂಟಾಗುವ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿರುದ್ಧ ಭುಜಗಳ ಮೊತ್ತವು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿರುದ್ಧ ಭುಜಗಳ ಉದ್ದಗಳ ಮೊತ್ತಗಳು ಸಮಾನವಾದರೆ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳೂ ಸ್ವರ್ಶರೇಖೆಗಳಾಗುವ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ವೃತ್ತದ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಚಿಸುವ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿರುದ್ಧ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತಗಳು ಸಮಾನವೆಂದು ಈ ಮೊದಲೇ ಕಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿರಿ.

ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವ ಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಗೆರೆಗಳು ಸಮಾನವೆಂದು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವೃತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಗೆರೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ, ಗೆರೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ವೃತ್ತದ ಹೊರಗಿರುವ ಗೆರೆಯ ಉದ್ದದ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳು ಸಮಾನವೆಂದು ವೃತ್ತಗಳು ಎಂಬ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮವಾಕ್ಯವು ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲವೆ?



ಇನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರೋ?

ಜಿಯೋಜಿಬ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಶರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಅವುಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ. ಈ ಬಿಂದುಗಳು ಶಿರವಾಗುವಂತೆ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವರ್ಶರೇಖೆಗಳನ್ನು *hide* ಮಾಡಬೇಕು. ಚತುರ್ಭುಜದ ಭುಜಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ವೃತ್ತದ ಬಿಂದುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೋಡಿರಿ.



$$\sqrt{2}$$

$$\sqrt{3}$$

$$\sqrt{5}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$


$$\frac{1}{7}$$

$$\frac{1}{3}$$


$$\frac{1}{10}$$

$$x^2 - a^2$$

$$(0, 1)$$




$$an+b$$




ಬದಲಾಗದ ಸಂಬಂಧ


ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:



ಇದರಲ್ಲಿ $PA \times PB = PC \times PD$ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆಯಲ್ಲವೇ?



ಕೆಳಗಿನ ರೇಖೆ, ಚಲಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆ ಆದರೋ? PD ಎಂಬುದು PC ಯೇ ಆಗಿರುವುದು; ಮೊದಲೇ ನೋಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ.




$PA \times PB = PC^2$ ಎಂದಾಗುವುದು.

ಮೇಲಿನ ರೇಖೆಯೂ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯಾದರೋ?


ಈ ಸಂಬಂಧ $PA^2 = PC^2$ ಅಥವಾ $PA = PC$ ಎಂದಾಗುವುದು.

ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಉದ್ದವಿರುವುದೆಂದು ಮೊದಲೇ ನೋಡಿರುವಿರಲ್ಲವೇ?

ಇವುಗಳೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, AC, BC ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕು.



AC ಎಂಬ ಜ್ಯಾವು, PC ಎಂಬ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ C ಯಲ್ಲಿ $\angle PCA$ ಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು. ಇದು ವೃತ್ತದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ AC ಉಂಟುಮಾಡುವ $\angle ABC$ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ.



ಅಂದರೆ, ತ್ರಿಕೋನ PCA ಯಲ್ಲಿ C ಯ ಕೋನವು, ತ್ರಿಕೋನ PBC ಯಲ್ಲಿ B ಯ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ. P ಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತ್ರಿಕೋನಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಕೋನವಾಗಿದೆ.

ಅಂದರೆ, ಈ ತ್ರಿಕೋನದ ಕೋನಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಮಾನ ಕೋನಗಳ ಎದುರಿರುವ ಭುಜಗಳ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.


PAC ಯಲ್ಲಿ x° ಕೋನದ ಎದುರಿರುವ ಭುಜ PA ಯೂ, PBC ಯಲ್ಲಿ x° ಕೋನದ ಎದುರಿರುವ ಭುಜವು PC ಯೂ ಆಗಿದೆ. PAC ಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭುಜವು PC ಮತ್ತು PBC ಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭುಜವು PB ಆಗಿದೆ.

ಆಗ


$$\frac{PA}{PC} = \frac{PC}{PB}$$

ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು.

$$PA \times PB = PC^2$$




$$\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$





ವೃತ್ತವನ್ನು ತುಂಡರಿಸುವ ಗೆರೆಯ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅದೇ ವೃತ್ತದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗೆರೆಯ ಉದ್ದ ಇವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು, ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯ ಉದ್ದದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಪರಸ್ಪರ ತುಂಡರಿಸಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜ್ಯಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇದನ್ನೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ತುಂಡರಿಸುವ ಗೆರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಗೆರೆಯ ವೃತ್ತದ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗವು ಭುಜಗಳಾಗಿರುವ ಆಯತಕ್ಕೂ, ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯು ಭುಜವಾಗಿರುವ ಚೌಕಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿರುವುದು.




- (1) ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.
ತ್ರಿಕೋನದ ಸುತ್ತಳತೆಯು, ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.
- (2) ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಮೂರು ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.



ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಶಿರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರಿ.


$$(0, 1)$$






(3) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಆ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕವಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೇಖೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.


- i) ಈ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯನ್ನು, ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯು ಸಮಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.
- ii) ಈ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ತ್ರಿಕೋನವು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನವೆಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.
- iii) ಬಲಭಾಗದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನುಕೂಲವಾದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನೋಟು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರಿ. ವೃತ್ತಗಳು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ರಚಿಸುವ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಾಗಿರುವುದು?




(4) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ P ಎಂಬುದು AB ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದು ಆಗಿದೆ. P ಯಿಂದ ಇರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯು ವೃತ್ತವನ್ನು Q ವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು. ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟಾಗಿರುವುದು?



$$\frac{\pi + \sqrt{5}}{2}$$



- (5) ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಗೆರೆಯನ್ನು ವೃತ್ತದ ಹೊರಗೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯ ಉದ್ದ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.




ಇದೇ ಗೆರೆಯನ್ನು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯಾಗಿದೆ ಎರಡನೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದು. ಈ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಯ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಾಗಿರುವುದು?

- (6) 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಭುಜವಿರುವ ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಷ್ಟೇ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿರುವ, ಒಂದು ಭುಜ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಭುಜವಿರುವ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ.

ಗೆರೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ವೃತ್ತ

ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಎಳೆಯಬಹುದೆಂದು ನೋಡಿದೆವು.


ಆಗ ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದೇ? ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.



ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಈ ಗೆರೆಗಳಿಗೆ ಲಂಬಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ, ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರವು ಈ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ಈ ಕೋನದ ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ.

ಸಂಧಿಸುವ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರವು ಗೆರೆಗಳು ಸೇರುವ ಕೋನದ ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಾಗಿದೆ.

ಕೋನದ ಸಮಭಾಜಕದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.



ಆಗ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನದ ಮೂರು ಭುಜಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ.

$$\sqrt{2}$$

$$\sqrt{3}$$

$$\sqrt{5}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{7}$$



$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{10}$$

$$x^2 - a^2$$


$$(0, 1)$$






ಜಿಯೋಜಿಬ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಭಾಜಕವನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ. ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಕೋನದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಭುಜಕ್ಕೆ ಲಂಬವನ್ನು ಎಳೆದು, ಲಂಬವೂ ಭುಜವೂ ಸಂಧಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ. ಸಮಭಾಜಕದ ಬಿಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗುವಂತೆ, ಭುಜಗಳ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ. ಈ ವೃತ್ತವು, ಕೋನದ ಎರಡನೇ ಭುಜವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆ? ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೋಡಿರಿ.

ಕೆಳಗಿನ ಹಾಗೂ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಭುಜಗಳು ಸೇರುವ ಕೋನದ ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ, ಆ ಎರಡು ಭುಜಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.





ಕೆಳಗಿನ ಹಾಗೂ ಬಲಭಾಗದ ಭುಜಗಳು ಸೇರುವ ಕೋನದ ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ ಈ ಎರಡು ಭುಜಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.



ಆಗ ಈ ಎರಡೂ ಸಮಭಾಜಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುವನ್ನು, ಪರಿಗಣಿಸಿದರೋ? ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಬಿಂದು?

ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮೂರು ಭುಜಗಳಿರುವ ಲಂಬಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಉದ್ದವಿರುವುದಲ್ಲವೇ? ಈ ಉದ್ದವು ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗುವಂತೆಯೂ ಈ ಬಿಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗುವಂತೆಯೂ ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆ?

ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ತ್ರಿಕೋನದ ಅಂತರ್‌ವೃತ್ತ (incircle) ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡಾ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತರ್‌ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕಿರುವ ಭುಜಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಲಂಬಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಉದ್ದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರವು ಈ ಭುಜಗಳು ಸೇರುವ ಕೋನದ ಸಮಭಾಜಕದಲ್ಲಿರುವುದು.



ಜಿಯೋಜಿಬ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರ ಅಂತರ್‌ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ.


Mathematical symbols and numbers on the left margin: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{10}$, $x^2 - a^2$.

Large numbers on the right margin: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

(0, 1)



$an + b$




ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಕೋನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೋನಗಳ ಸಮಭಾಜಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವುದು.


ಅಂತರ್ವೃತ್ತವು ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಭುಜಗಳೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ.

ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನದ ಅಂತರ್ವೃತ್ತವು ಭುಜಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಜೋಡಿಸಿರಿ.

ತ್ರಿಕೋನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿರದಿಂದಲೂ



ಅಂತರ್ವೃತ್ತಕ್ಕಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು ಸೇರಿರುವುದೇ ತ್ರಿಕೋನದ ಭುಜಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿರಗಳಿಂದಲೂ, ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳ ಉದ್ದಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿವೆ. ಆಗ ಸ್ಪರ್ಶ ರೇಖೆಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು x, y, z ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.



ಈ ಉದ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೂಡಿಸಿದರೆ, ತ್ರಿಕೋನದ ಸುತ್ತಳತೆ ಸಿಗುವುದು. ಅಂದರೆ $2(x + y + z)$ ತ್ರಿಕೋನದ ಸುತ್ತಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, $x + y + z$ ಎಂಬುದು ಸುತ್ತಳತೆಯ ಅರ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು s ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ

$$x + y + z = s$$

ಇನ್ನು ತ್ರಿಕೋನದ ಭುಜಗಳ ಉದ್ದಗಳು a, b, c ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಿಂದ

$$x + y = a$$


$$y + z = b$$


$$z + x = c$$

ಎಂಬತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಪರಿವೃತ್ತವೂ ಅಂತರ್ವೃತ್ತವೂ

ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಕೋನಕ್ಕೂ ಪರಿವೃತ್ತವನ್ನೂ ಅಂತರ್ವೃತ್ತವನ್ನೂ ರಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಇವುಗಳು ಎರಡೂ ಇರಲಾರದು. ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರ, ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಇವೆರಡೂ ಇರಬಹುದು.





ಗಣಿತ x

ಇನ್ನು x ಸಿಗಲು $x+y+z$ ನಿಂದ $y+z$ ನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ

$$x = (x+y+z) - (y+z) = s - b$$


ಇದರಂತೆ

$$y = (x+y+z) - (z+x) = s - c$$

ಎಂದೂ


$$z = (x+y+z) - (x+y) = s - a$$

ಎಂದು ಸಿಗುವುದು. ಆಗ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು.






ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಭುಜಗಳ ಉದ್ದಗಳು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ತ್ರಿಕೋನದ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಅರ್ಧ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು.

ಆಗ ಅಂತರ್‌ವೃತ್ತವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳು ಭುಜವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವುದು $9-5=4$, $9-6=3$, $9-7=2$ ಎಂಬೀ ಕ್ರಮದಲ್ಲಾಗಿದೆ.



ಅಂತರ್‌ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೂ ತ್ರಿಕೋನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅಂತರ್‌ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ತ್ರಿಕೋನದ ಶಿರಗಳಿಗಿರುವ ಗೆರೆಗಳು ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ಮೂರಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವುದಲ್ಲವೆ.





ಈ ಸಣ್ಣ ತ್ರಿಕೋನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಭುಜವು, ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಕೋನದ ಒಂದು ಭುಜವೇ ಆಗಿದೆ; ಅದಕ್ಕಿರುವ ಉನ್ನತಿಯು ಅಂತರ್‌ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಗ ತ್ರಿಕೋನದ ಭುಜಗಳ ಉದ್ದಗಳು a, b, c ಎಂದೂ, ಅಂತರ್‌ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು r ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಸಣ್ಣ ತ್ರಿಕೋನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $\frac{1}{2}ar, \frac{1}{2}br, \frac{1}{2}cr$, ಎಂದಾಗುವುದು. ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತವು, ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಕೋನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ; ಅದನ್ನು A , ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ,



$$A = \frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br + \frac{1}{2}cr = \frac{1}{2}(a + b + c)r = sr$$

ಈ ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು


$$r = \frac{A}{s} \text{ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.}$$


ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನದ ಅಂತರ್‌ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು ತ್ರಿಕೋನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಸುತ್ತಳತೆಯ ಅರ್ಧದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ತ್ರಿಕೋನದ ಮೂರು ಭುಜಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ ತ್ರಿಕೋನದೊಳಗೆ ರಚಿಸುವ ವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತರ್‌ವೃತ್ತ. ಮೂರೂ ಭುಜಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಎಂದಾದರೆ ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಕೋನಕ್ಕೂ ಆ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವೃತ್ತಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತ್ರಿಕೋನದ ಬಾಹ್ಯವೃತ್ತಗಳು (excircles) ಎನ್ನುವರು. ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನವನ್ನೂ ಅದರ ಬಾಹ್ಯವೃತ್ತವನ್ನೂ ಪರಿಶೋಧಿಸುವ.



ವೃತ್ತವು ತ್ರಿಕೋನದ ಭುಜಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ P, Q, R





CP, CQ ಎಂಬೀ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ನೋಡುವ. ತ್ರಿಕೋನದಲ್ಲಿ BC, CA, AB ಎಂಬೀ ಭುಜಗಳ ಉದ್ದ a, b, c ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ,

$$CP = CB + BP = a + BP \quad CQ = CA + AQ = b + AQ$$

ಇನ್ನು B ಯಿಂದ ಇರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳಾದುದರಿಂದ, $BP = BR$ ಎಂದೂ, A ಯಿಂದ ಇರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳಾದುದರಿಂದ, $AQ = AR$ ಎಂದು ಸಿಗುವುದಲ್ಲವೆ; ಆದುದರಿಂದ

$$CP = a + BR \quad CQ = b + AR$$

$AR + RB = AB$ ಎಂದು ಸಿಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಸಮವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ,

$$CP + CQ = a + b + BR + AR = a + b + c \text{ ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು.}$$



ಇದು ತ್ರಿಕೋನದ ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲವೆ? ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, CP, CQ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಉದ್ದವಿರುವುದು. ಆಗ ಏನು ಸಿಗುವುದು?

$$CP = CQ = s$$

ಅಂದರೆ

ತ್ರಿಕೋನದ ಒಂದು ಶಿರದಿಂದ ಅದರ ಎದುರಿರುವ ಬಾಹ್ಯ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳ ಉದ್ದವು, ತ್ರಿಕೋನದ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಅರ್ಧವಾಗಿದೆ.


ಇನ್ನು ತ್ರಿಕೋನದ ಅಂತರ್‌ವೃತ್ತವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಂತರ್‌ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ r ಎಂದೂ, ಬಾಹ್ಯವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ r_1 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ.




P

ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ CIP, CQJ ಎಂಬೀ ತ್ರಿಕೋನಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೋನಗಳಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಮಾನ ಕೋನಗಳ ಎದುರಿರುವ ಭುಜಗಳ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯು ಸಮಾನವಾಗಿವೆ.

(1)





ಇನ್ನು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ: BIP, BJQ ಎಂಬೆ ತ್ರಿಕೋನಗಳಲ್ಲಿ B ಯ ಕೋನಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ. BI, BJ ಇವುಗಳು, ABC ಎಂಬ ತ್ರಿಕೋನದಲ್ಲಿನ B ಯ ಒಳಕೋನದ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಕೋನದ ಸಮಭಾಜಕವಾದುದರಿಂದ,

$$\angle QBJ = \frac{1}{2} \angle QBA = \frac{1}{2} (180^\circ - \angle CBA) = (90^\circ - \angle PBI)$$

ಆಗ PBI, QBJ ಎಂಬೆ ತ್ರಿಕೋನಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೋನಗಳಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ

$$\frac{r}{s-a} = \frac{s-b}{r_1}$$

ಅಡ್ಡಗುಣಾಕಾರವನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು.

$$(2) \quad rr_1 = (s-a)(s-b)$$

(1), (2) ಎಂಬ ಸಮವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ

$$\frac{r}{r_1} \times rr_1 = \frac{s-c}{s} \times (s-a)(s-b)$$

ಅಂದರೆ,

$$r^2 = \frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{s}$$


ABC ಎಂಬ ತ್ರಿಕೋನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು, rs ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವಲ್ಲವೆ. ಮೇಲಿನ ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ


$$\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

ತ್ರಿಕೋನದ ಭುಜಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಈ ವಿಧಾನವು ಹೆರೋನ್ ಸೂತ್ರವಾಕ್ಯ (Heron's Formula) ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು.



- (1) ಭುಜಗಳ ಉದ್ದವು 4ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, 5ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, 6ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರ ಅಂತರ್ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಅಂತರ್ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
- (2) ಭುಜಗಳ ಉದ್ದ 5ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, ಒಂದು ಕೋನ 50° ಆಗಿರುವ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಮಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಅದರ ಅಂತರ್ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.
- (3) ಒಂದು ಸಮಭುಜ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರ ಎರಡು ಭುಜಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧವೃತ್ತವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ರಚಿಸಿರಿ.






- (4) ಒಂದು ಸಮಭುಜ ತ್ರಿಕೋನದ ಅಂತರ್ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಅದರ ಪರಿವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಅರ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.
- (5) ಒಂದು ಲಂಬಕೋನತ್ರಿಕೋನದ ಕರ್ಣ h ಮತ್ತು ಅಂತರ್ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ r ಎಂದಾದರೆ, ತ್ರಿಕೋನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು, $r(h+r)$ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.
- (6) 13 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಭುಜಗಳಾಗಿರುವ ತ್ರಿಕೋನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪುನರವಲೋಕನ



ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನೆಗಳು	ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು	ಟೀಚರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು	ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
<ul style="list-style-type: none"> • ವೃತ್ತದ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆ ಎಂಬ ಆಶಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದು. • ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕವಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆ ಮತ್ತು ತ್ರಿಜ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. • ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಜ್ಯಾದ ಎರಡೂ ತುದಿ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ರಚಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳು ಸೇರುವ ಕೋನವು ಜ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕೋನ, ಜ್ಯಾದ ಕೇಂದ್ರೀಯಕೋನ, ಜ್ಯಾವು ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನೊಂದಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕೋನ, ಇವುಗಳೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. • ವೃತ್ತದ ಹೊರಗಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು. • ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನದ ಮೂರು ಭುಜಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಕೊಂಡು ಅದರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 			








ಘನಾಕೃತಿಗಳು




ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳು

ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಮಡಚಿ ಅಂಟಿಸಿ, ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು:



ಇಂತಹ ಸ್ತಂಭಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವೆವು.

ಇನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೋಡೋಣ.




ಗಣಿತ



ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರದಲ್ಲಿ

ಜಿಯೋಜಿಬ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆವಲ್ಲವೇ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. 3D Graphics ನ್ನು ತೆರೆದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. (9 ನೇ ತರಗತಿಯ ಸ್ತಂಭಗಳು ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯದ ಘನಾಕೃತಿಗಳು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿರಿ) Graphics ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪವನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ. 3D Graphics ನಲ್ಲಿ Extrude to Pyramid or Cone ನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಿ ಆಯತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಭಿಸುವ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. (ಒಂದು ಸ್ಲೈಡರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಎತ್ತರವಾಗಿ ಸ್ಲೈಡರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.)


ಮೊದಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು:



ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೌಕ. ಸುತ್ತಲೂ ನಾಲ್ಕು ತ್ರಿಕೋನಗಳು; ಇವು ನಾಲ್ಕು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ (ಸಮಾನವಾದ) ಸಮಪಾರ್ಶ್ವ ತ್ರಿಕೋನಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಮಡಚಿ ಅಂಟಿಸಿರಿ:




ಇದು ಯಾವ ಆಕೃತಿ? ಸ್ತಂಭವೆಂದು ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ತಂಭಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯತಗಳು ಆಗಿವೆ. ಈಗ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆಕೃತಿಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಕೆಳಗೆ ಚೌಕ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಒಂದು ತುದಿ, ಸುತ್ತಲೂ ತ್ರಿಕೋನಗಳು.






ಚೌಕದ ಬದಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಯತವಾಗಬಹುದು; ಅದೂ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತ್ರಿಕೋನವೋ ಇತರ ಯಾವುದಾದರೂ ಬಹುಭುಜಗಳೋ ಆಗಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. (ಪಾದವು ಸಮಬಹುಭುಜವಾದಾಗ ಅಂದವಿರುವುದು)

ಇಂತಹ ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಸರು ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳು (pyramids) ಎಂದಾಗಿದೆ .




$$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$




ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು

ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳ ಪಾದವಾದ ಬಹುಭುಜದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳ ಪಾದದ ಅಂಚುಗಳು (base edges) ಎಂದೂ ತ್ರಿಕೋನಗಳ ಇತರ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂಚುಗಳು (lateral edges) ಎಂದೂ ಕರೆಯುವರು. ಮೇಲ್ಭಾಗದ ತುದಿಯನ್ನು ಅದರ ಶೀರ್ಷ (apex) ಎಂದು ಹೇಳುವರು.




ಒಂದು ಸ್ತಂಭದ ಉನ್ನತಿಯೆಂಬುದು ಅವುಗಳ ಪಾದಗಳೊಳಗಿನ ಅಂತರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ. ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಉನ್ನತಿಯೆಂದರೆ ಅದರ ಶೀರ್ಷದಿಂದ ಪಾದಕ್ಕಿರುವ ಲಂಬ ದೂರವಾಗಿದೆ.



ವಿಸ್ತೀರ್ಣ


ಪಾದದ ಅಂಚುಗಳು 10ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂಚುಗಳು 13ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು? ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಂದರೆ, ಈ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾಗದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ. ಈ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು?





ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ರಚಿಸಿದ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ, ಬಿಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆ 3D Graphics ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. Net ನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಆಕೃತಿಯು ಲಭಿಸುವುದು. (ಇದನ್ನು ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ Net ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವರು.) ಇದರೊಡನೆ Graphics ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡರೂ ಲಭಿಸುವುದು. ಈ ಸ್ಲೈಡರನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಿ Net ನಿಂದ ಪಿರಮಿಡ್ಡು ರೂಪಿಸುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. Algebra ದಲ್ಲಿ Pyramid ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಹೆಸರಿನ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು hide ಮಾಡಬೇಕು.



$$(0, 1)$$



$$an+b$$



ಇದರ ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 100 ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ತ್ರಿಕೋನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನಾದರೆ?



ತ್ರಿಕೋನದ ಅಂಚುಗಳು 10, 13, 13 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೆರೋನಿನ ಸೂತ್ರವಾಕ್ಯದ ಸಹಾಯವಿದೆಯಲ್ಲವೇ. ಸುತ್ತಳತೆಯ ಅರ್ಧದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಕಳೆದರೆ,

$$\sqrt{18 \times 8 \times 5 \times 5} = \sqrt{9 \times 16 \times 5 \times 5} = 60$$

ಎಂದು ಸಿಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತ್ರಿಕೋನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 60 ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿದೆ. ಆಗ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು,

$$100 + (4 \times 60) = 340 \text{ ಚದರಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿದೆ.}$$

ತ್ರಿಕೋನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಪಾದದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಅರ್ಧವಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.




ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಕೋನದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸಮಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ತ್ರಿಕೋನವಾದುದರಿಂದ, ಈ ಲಂಬವು ಕೆಳಗಿನ ಭುಜವನ್ನು ಸಮಭಾಗ ಮಾಡುವುದು.

ಪೈಥಗೋರಸನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ, ಲಂಬದ ಉದ್ದವು

$$\sqrt{13^2 - 5^2} = 12 \text{ ಸೆ.ಮೀ}$$

ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಆಗ ತ್ರಿಕೋನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು $5 \times 12 = 60$ ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿದೆ.


ಕಾಗದದ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಉನ್ನತಿಯು ಎಷ್ಟಾಗಿರುವುದು?



ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ

ಜಿಯೋಜಿಬ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೌಕವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. Midpoint or Centre ನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಒಂದು ಪಾದದ ಅಂಚಿನ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. Segment ನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. Polygon ನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ ಉನ್ನತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂಚು, ಪಾದದ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಎಂಬವುಗಳು ಭುಜಗಳಾಗಿ ಬರುವ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. Net ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟು ನೋಡಬಹುದು. ಬೇಕಾದರೆ hide ಮಾಡಬಹುದು.





ಈ ಉದ್ದವನ್ನು ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಎತ್ತರ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ (slant height) ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಈಗ ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾದದ ಅಂಚು, ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿಗಳೊಳಗಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿದೆವಲ್ಲವೇ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನವು ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಿಯ ಇದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಪಾದದ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಲಂಬ ಬದಿಗಳಾಗಿಯೂ, ಕರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂಚೂ ಇರುವುದು.

ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದೇ? ಪಾದದ ಅಂಚುಗಳು 2 ಮೀಟರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂಚುಗಳು 3 ಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಹೊರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು?



ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4 ಚದರಮೀಟರು. ಪಾರ್ಶ್ವ ಮುಖಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭುಜವು ಪಾದದ ಅರ್ಧವಾದ 1 ಮೀಟರು ಮತ್ತು ಕರ್ಣವು ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂಚು ಆಗಿರುವ 3 ಮೀಟರು, ಆದುದರಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿಯು

$$\sqrt{3^2 - 1^2} = 2\sqrt{2} \text{ ಮೀಟರು.}$$


ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತ್ರಿಕೋನ ಮುಖಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು $\frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ ಚದರಮೀಟರು.



ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು $4 + (4 \times 2\sqrt{2}) = 4 + 8\sqrt{2}$ ಚದರಮೀಟರು.

ಇದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕಾಲ್ಕುಲೇಟರನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ (ಅಲ್ಲವಾದರೆ $\sqrt{2}$ ಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮಾನವಾದ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ), ಇದು ಸುಮಾರು 15.31 ಚದರಮೀಟರು ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.



- (1) ಅಂಚುಗಳು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಉದ್ದವಿರುವ ಒಂದು ಚೌಕ; ಒಂದು ಭುಜ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ಶಿರಕ್ಕಿರುವ ಉನ್ನತಿ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸಮಪಾರ್ಶ್ವ ತ್ರಿಕೋನಗಳು; ಇವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚದರಮೀಟರು ಹಾಗದ ಬೇಕಾಗುವುದು?
- (2) ಚೌಕ ಸ್ತಂಭಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಆಟಕಿಯ ಪಾದದ ಅಂಚು 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ 500 ಆಟಕಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಚದರ ಮೀಟರಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ 80ರಂತೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು?





- (3) ಒಂದು ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮುಖಗಳು ಸಮಭುಜತ್ರಿಕೋನಗಳಾಗಿವೆ. ಅದರ ಪಾದದ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆದರೆ ಹೊರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು?
- (4) ಒಂದು ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾದದ ಸುತ್ತಳತೆ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, ಅಂಚುಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 92 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿದೆ. ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಹೊರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
- (5) ಪಾರ್ಶ್ವಮುಖ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?


ಉನ್ನತಿಯೂ ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿಯೂ

ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ್ಯತೆಯಿರುವ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ.

ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನಾಕೃತಿಯ ಒಂದು ಡೇರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಡೇರೆಯ ಪಾದದ ಅಂಚುಗಳು 6 ಮೀಟರು ಮತ್ತು ಎತ್ತರವು 4 ಮೀಟರು ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚದರಮೀಟರು ಕ್ಯಾನ್‌ವಾಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗುವುದು?

ಡೇರೆಯ ಅಂಚುಗಳಾಗಿರುವ ತ್ರಿಕೋನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು?


ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:



ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿಯು AM ಆಗಿದೆ. CM ನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದರೆ, AM ಕರ್ಣವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನವು ಲಭಿಸುವುದಲ್ಲವೇ? ಅದರಲ್ಲಿ CM ನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಾಗಿರುವುದು?

ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳು

ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ಚಿತ್ರವು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳಾಗಿವೆ. ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಾಗಿ 138 ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಿ. ಪೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.




ಚಿತ್ರದಿಂದ $AM = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ ಮೀಟರು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು.

$\sqrt{2}$
 $\sqrt{3}$
 $\sqrt{5}$
 $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 $\frac{1}{7}$
 $\frac{3}{1}$
 $\frac{1}{10}$
 $x^2 - a^2$


9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0

(0, 1)



$an + b$

$$\frac{\pi + \sqrt{5}}{2}$$




ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು

ಆಗ ಡೇರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಉದ್ದ 6ಮೀಟರು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಿರುವ ಉನ್ನತಿ 5ಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸಮಪಾರ್ಶ್ವ ತ್ರಿಕೋನಗಳ ಆಗತ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು, $4 \times \frac{1}{2} \times 6 \times 5 = 60$ ಚದರಮೀಟರು ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ. ಡೇರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್‌ವಾಸ್ ಆಗತ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ವಿಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ.

ಯಾವುದೇ ಚೌಕಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳಾದರೂ ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿಯು ಕರ್ಣವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಲಂಬ ಅಂಚುಗಳು ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಪಾದದ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಧ ಆಗಿರುವುದು.



ಮಹಾಪಿರಮಿಡ್ಡು

ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಗಿಝಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಪಿರಮಿಡ್ಡು (Great Pyramid of Giza) ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಿರಮಿಡ್ಡಾಗಿದೆ.





ಇದರ ಪಾದವಾಗಿರುವ ಚೌಕಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧಲಕ್ಷ ಚದರ ಮೀಟರಿನಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿದೆ. ಉನ್ನತಿ ಸುಮಾರು 140 ಮೀಟರು ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.



ನಿಖರವಾದ ಚೌಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಬೃಹದಾಕಾರದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಈ ವೈಭವೋಪೇತವಾದ ಸಮಾಧಿಗಳು ಮಾನವ ಪರಿಶ್ರಮದ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕೌಶಲ್ಯದ ಹಾಗೂ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿವೆ.



(1) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೌಕವನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.



ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಉನ್ನತಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುವುದು? ಚೌಕವೂ ತ್ರಿಕೋನಗಳೂ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದರೋ?





24 ಸೆ.ಮೀ.


30 ಸೆ.ಮೀ.



$$an + b$$




- (2) ಕಾಗದವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಚೌಕಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಪಾದದ ಅಂಚು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರಬೇಕು. ತ್ರಿಕೋನಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು?
- (3) ಯಾವುದೇ ಚೌಕಪಿರಮಿಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂಚುಗಳ ವರ್ಗಗಳು ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದೆಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.
- (4) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಪಾರ್ಶ್ವ ತ್ರಿಕೋನವು ಪಾರ್ಶ್ವಮುಖಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಚೌಕಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಎತ್ತರವೆಷ್ಟು? ಪಾದದ ಅಂಚು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿನ ಬದಲು 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಾದರೋ?



ಸಮಾನವಾದ ಯಾವುದೇ ನಾಲ್ಕು ಸಮಪಾರ್ಶ್ವ ತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಿ ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ?

ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲ

ಯಾವುದೇ ಸ್ತಂಭದ ಘನಫಲವೆಂಬುದು ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಯ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ ಯೆಂದು ನೋಡಿದೆವಲ್ಲವೇ. ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲವೋ? ಚೌಕಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸುವ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ದಪ್ಪ ಕಾಗದವನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ತೆರೆದ ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರಿ. ಇನ್ನು ಪಾದದ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಯಿರುವ ಒಂದು ತೆರೆದ ಚೌಕ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.





ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲ

ಸಮಾನ ಪಾದ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಯಿರುವ ಒಂದು ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಚೌಕಸ್ತಂಭವನ್ನು ಜಿಯೋಜಿಬುದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕನೆ ಗುರುತಿಸಲು ಒಳಗಿರುವ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ Opacity 100 ನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. (Right click → Object properties → colour) Volume ನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಿ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಮತ್ತು ಸ್ತಂಭದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇವುಗಳೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು? ಇವುಗಳ ಪಾದ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೋ?

ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರಿ. ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಹೊಗೆಯ ಗಾತ್ರದ ಎತ್ತರವು ಸ್ತಂಭದ ಎತ್ತರದ ಎಷ್ಟು ಭಾಗವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಒಂದಲ್ಲವೇ? ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ತುಂಬಲು ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೊಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಆಗ ಘನಫಲವು ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲದ ಮೂರು ಮಡಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಾಣಬಹುದು. (ಇದರ ಗಣಿತ ಪರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಾಠದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ)

ಸ್ತಂಭದ ಘನಫಲವು ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಯ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವೆವು.





ಆಗ ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲದ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳಬಹುದು?

ಚೌಕಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲವು ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಯ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಮೂರರಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪಾದದ ಅಂಚುಗಳು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ಚೌಕಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲವು $\frac{1}{3} \times 10^2 \times 8 = 266 \frac{2}{3}$ ಘನಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿದೆ.

ಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಒಂದು ಚೌಕ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಉದ್ದ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕರಗಿಸಿ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಪಾದದ ಅಂಚಾಗಿರುವ ಒಂದು ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಉನ್ನತಿ ಎಷ್ಟು?

ಚೌಕ ಗಟ್ಟಿಯ ಘನಫಲ 15^3 ಘನಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ?


ಇದನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಚೌಕಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲ. ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲವು ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಉನ್ನತಿಯ ಮೂರರಲ್ಲೊಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಸಿಗುವುದಲ್ಲವೇ.



ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 25^2 ಚದರಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಉನ್ನತಿಯ ಮೂರರಲ್ಲೊಂದು $\frac{15^3}{25^2}$ ಆಗಿದೆಯೆಂದೂ, ಇದರಿಂದ ಉನ್ನತಿಯು

$$3 \times \frac{15^3}{25^2} = 16.2 \text{ ಸೆಂಟಿಮೀಟರು}$$

ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು.

- ?
- (1) ಪಾದದ ಅಂಚು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ಚೌಕಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲ ಎಷ್ಟು?
 - (2) ಎರಡು ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳ ಘನಫಲಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿವೆ. ಎರಡನೆಯ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾದದ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದವು ಮೊದಲನೆಯ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾದದ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದದ ಅರ್ಧದಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೆಯ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಉನ್ನತಿಯು ಒಂದನೇ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಉನ್ನತಿಯ ಎಷ್ಟು ಮಡಿಯಾಗಿದೆ?
 - (3) ಎರಡು ಚೌಕಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳ ಪಾದದ ಅಂಚುಗಳು 1 : 2 ಎಂಬ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಉನ್ನತಿಗಳು 1 : 3 ಎಂಬ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಒಂದನೆಯ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲವು 180 ಘನಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬಹುದು?
 - (4) ಅಂಚುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಚೌಕಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾದದ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿದೆ. ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
 - (5) ಒಂದು ಚೌಕಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿಯು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಹೊರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 896 ಚದರಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿದೆ. ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.






- (6) ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಚೌಕಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಹೊರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 360 ಚದರಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿದೆ. ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲವೆಷ್ಟು?
- (7) ಅಂಚುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಚೌಕಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಉನ್ನತಿ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಘನಫಲ ಎಷ್ಟು?
- (8) ಪಾದದ ಸುತ್ತಳತೆ 64 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಘನಫಲವು 1280 ಘನಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ಚೌಕಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಹೊರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು?

ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡು

ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭಗಳಂತೆ, ಪಾದವು ವೃತ್ತವಾಗಿರುವ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳೂ ಇವೆ:




ಇವುಗಳನ್ನು ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳು (cones) ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಆಯತವನ್ನು ಬಾಗಿ ಸಿ ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದಂತೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಬಾಗಿ ಸಿ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. (ಮುಚ್ಚಿದ ಪಿರಮಿಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬೇರೆಯೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತ ಬೇಕಾಗುವುದು.)



ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡು

ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನಂತೆ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. Graphics ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿ 3D Graphics ನಲ್ಲಿ Extrude to Pyramid or Cone ನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸ್ಲೈಡರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.




ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಗಿರುವ ಸೆಕ್ಟರಿನ ಅಳತೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಅಳತೆಗಳೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು?

$\sqrt{2}$
 $\sqrt{3}$
 $\sqrt{5}$
 $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 $\frac{1}{7}$
 $\frac{1}{3}$
 $\frac{1}{10}$
 $x^2 - a^2$


9
8
7
6
5
4
3
2
1
0



$$\frac{\pi + \sqrt{5}}{2}$$



ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು



ಸೆಕ್ಟರಿನ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿಯಾಗುವುದು; ಸೆಕ್ಟರಿನ ಚಾಪದ ಉದ್ದವು ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾದದ ಸುತ್ತಳತೆಯಾಗುವುದು.

ಸೆಕ್ಟರಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

ತ್ರಿಜ್ಯ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತದಿಂದ 45° ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನವಿರುವ ಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಬಾಗಿ ಸಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟು?

ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯದ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವೇ? 45° ಎಂಬುವುದು, 360° ಯ $\frac{1}{8}$ ಭಾಗವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ. ಸೆಕ್ಟರಿನ ಚಾಪದ ಉದ್ದವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತಿಕವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಈ ಸೆಕ್ಟರಿನ ಚಾಪದ ಉದ್ದವು ಒಟ್ಟು ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆಯ $\frac{1}{8}$ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಾಪವು ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾದದ ವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾದದ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದ $\frac{1}{8}$ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು, ಸುತ್ತಳತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾತಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯದ $\frac{1}{8}$ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವು $12 \times \frac{1}{8} = 1.5$ ಸೆಂಟಿಮೀಟರು.

ವಿಲೋಮವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದರೆ?

ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿಯು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತದಿಂದಲೇ ಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಇದರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನವು ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು?

$$\sqrt{2}$$

$$\sqrt{3}$$

$$\sqrt{5}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$


$$\frac{1}{7}$$



$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{10}$$

$$x^2 - a^2$$

$$(0, 1)$$





ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾದವಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯದ $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ ಭಾಗವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ. (ಅದು ಹೇಗೆ?). ಆಗ ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆಯ $\frac{1}{3}$ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆ ಸೆಕ್ಟರಿನ ಚಾಪದ ಉದ್ದವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ. ಆಗ ಸೆಕ್ಟರಿನ ಚಾಪವು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದ ವೃತ್ತದ $\frac{1}{3}$ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಅದರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನವು $360 \times \frac{1}{3} = 120^\circ$.

(1) ತ್ರಿಜ್ಯ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ 60° ಆಗಿರುವ ಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಬಾಗಿ ಸಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುವುದು?

(2) ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸೆಕ್ಟರಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ ಎಷ್ಟು?

(3) ಒಂದು ಅರ್ಧವೃತ್ತವನ್ನು ಬಾಗಿ ಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿಗಳೊಳಗಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎಷ್ಟು?

ವಕ್ರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ


ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭಕ್ಕಿರುವಂತೆಯೇ, ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿಗೂ ಒಂದು ವಕ್ರಮೈ ಇದೆ; ಅದರ ಓರೆಯಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕಿರುವ ಭಾಗ. ಈ ವಕ್ರಮೈಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ವೃತ್ತಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ಬಾಗಿ ಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸೆಕ್ಟರಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. (ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ವಕ್ರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಂಬುವುದು ಅದರ ವಕ್ರಮೈಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ.) ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ.


ತ್ರಿಜ್ಯ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಟೋಪಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಕಾಗದ ಬೇಕಾಗಬಹುದು?

ಇಂತಹ ಟೋಪಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸೆಕ್ಟರಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿಯು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಷ್ಟೇ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾದವಾದ ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರಬೇಕು.

ಅಂದರೆ, ಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯದ $\frac{8}{30} = \frac{4}{15}$ ಭಾಗ. ಆಗ ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆಯು, ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆಯ $\frac{4}{15}$ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.






ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಬೇಕಾದ ಸೆಕ್ಟರಿನ ಚಾಪದ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಬೇಕಾದ ಸೆಕ್ಟರು ವೃತ್ತದ $\frac{4}{15}$ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ,

$$\pi \times 30^2 \times \frac{4}{15} = \pi \times 2 \times 30 \times 4 = 240\pi$$


ಆದುದರಿಂದ, ಟೋಪಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು 240π ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಕಾಗದ ಬೇಕು. (ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಸುಮಾರು 754 ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.)

ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ವೃತ್ತಪಿರಮಿಡ್ಡಿನಲ್ಲೂ ಪಾದದಿಂದ ಶೀರ್ಷಕಿರುವ ಲಂಬ ದೂರವು ಉನ್ನತಿಯಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಪಿರಮಿಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾದವಾಗಿರುವ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಶೀರ್ಷಕಿರುವ ದೂರವಾಗಿದೆ.



ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನಲ್ಲೂ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ ಎಂಬವುಗಳೊಳಗೆ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನ ಸಂಬಂಧವಿದೆ:

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ವೃತ್ತಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ $\sqrt{5^2 + 10^2} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}$ ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿದೆ.



ವಕ್ರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಒಂದು ವೃತ್ತಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ವಕ್ರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸೆಕ್ಟರಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೇ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ. ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ r ಎಂದೂ ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ l ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಸೆಕ್ಟರಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ l ಎಂದೂ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ $\frac{r}{l} \times 360$ ಎಂದೂ ಸಿಗುವುದು. ಆಗ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ,


$$\frac{1}{360} \times \left(\frac{r}{l} \times 360 \right) \times \pi l^2 = \pi r l$$

ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. (ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟರಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿದುದು ನೆನಪಿಸಿರಿ.)

ಅಂದರೆ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ವಕ್ರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಪಾದದ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ ಎಂಬವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಅರ್ಧದಷ್ಟಾಗಿದೆ.



- (1) ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ವಕ್ರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು?
- (2) ಪಾದದ ವ್ಯಾಸ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು?
- (3) ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹೂದಾನಿಯ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ 10000 ಹೂದಾನಿಗಳ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದಿಂದ ಅಂಟಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಚದರಮೀಟರು ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದಕ್ಕೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು?



(4) ಒಂದು ಅರ್ಧವೃತ್ತವನ್ನು ಬಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ವಕ್ರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಅದರ ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಎರಡು ಮಡಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.

ವೃತ್ತದ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲ

ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಪಾದ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಯಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲವು ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭದ ಘನಫಲದ ಮೂರರಲ್ಲೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು. ಎಂದರೆ,

ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲವು ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಯ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಮೂರರಲ್ಲೊಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ.



ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲ

ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲ ಎಂಬ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಮಾನ ಪಾದ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಯಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತಪಿರಮಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಘನಫಲವನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿರಿ.


(ಇದರ ಗಣಿತ ಪರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಾಠದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.) ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲವು

$$\frac{1}{3} \times \pi \times 4^2 \times 6 = 32\pi$$

ಘನಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿದೆ.



- (1) ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡಿನ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆತ್ತಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲ ಎಷ್ಟು?
- (2) ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ಲೋಹದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ಎಷ್ಟು ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು?
- (3) 216° ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ ಮತ್ತು 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಬಾಗಿ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯವೂ ಉನ್ನತಿಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿರುವುದು? ಘನಫಲವೋ?
- (4) ಎರಡು ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯು 3 : 5 ಹಾಗೂ ಉನ್ನತಿಗಳೊಳಗಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ 2 : 3, ಆಗಿರುವುದಾದರೆ ಅವುಗಳ ಘನಫಲಗಳೊಳಗಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎಷ್ಟು?
- (5) ಸಮಾನ ಘನಫಲಗಳೊಳಗಿರುವ ಎರಡು ವೃತ್ತಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳೊಳಗಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯು 4 : 5 ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಉನ್ನತಿಗಳೊಳಗಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.




ಗೋಳ

ಚಂಡಾಟದ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿಯೂ, ಲಡ್ಡಿನ ಸಿಹಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಳಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದೇವಲ್ಲವೆ? ಇನ್ನು ಗೋಳದ ಗಣಿತವನ್ನು ನೋಡೋಣ. (ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಳಕ್ಕೆ sphere ಎಂದು ಹೆಸರು.)



ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಅಥವಾ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ, ವೃತ್ತ ಸಿಗುವುದು. ಗೋಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದರೂ ವೃತ್ತ ಸಿಗುವುದು.

ಒಂದು ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ಅಂತರ ಸಮಾನವಲ್ಲವೇ. ಗೋಳಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಿದೆ; ಅದರಿಂದ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುಗಿರುವ ದೂರ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆ ಅಂತರವನ್ನು ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎನ್ನುವರು. ಅದರ ಎರಡು ಮಡಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಸವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. ಒಂದು ಗೋಳವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅರ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ, ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸಗಳು ಗೋಳದ ಕೇಂದ್ರ, ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸಗಳೇ ಆಗಿವೆ.



ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಿದ ಆಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಗೋಳವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟು ಹೊರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ನೆರಿಗೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಗೋಳವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಮತಲವನ್ನಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ. ಆದರೆ ಒಂದು ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು r ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $4\pi r^2$ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. (ವಿವರಣೆ ಪಾಠದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.).


ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡಿ

ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು, ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯದ ವರ್ಗವನ್ನು 4π ಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದುದಾಗಿದೆ.

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತ್ರಿಜ್ಯ r ಆಗಿರುವ ಗೋಳದ ಘನಫಲವು $\frac{4}{3}\pi r^3$ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (ಇದರ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಪಾಠದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.).

ಗೋಳವೂ ಸ್ತಂಭವೂ

ಒಂದು ಗೋಳವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಆವರಿಸುವ ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭದ ತ್ರಿಜ್ಯವೇ ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯವೂ, ಉನ್ನತಿಯು ಈ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಎರಡು ಮಡಿಯೂ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ:



ಅಂದರೆ ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯ r ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭದ ತ್ರಿಜ್ಯ r , ಉನ್ನತಿ $2r$. ಆಗ ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭದ ಹೊರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ


$$(2\pi r \times 2r) + (2 \times \pi r^2) = 6\pi r^2$$


ಗೋಳದ ಹೊರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $4\pi r^2$. ಈ ಎರಡೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳೊಳಗಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ 3:2 ಆಗಿದೆ.

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ತಂಭದ ಘನಫಲ

$$\pi r^2 \times 2r = 2\pi r^3$$


ಮತ್ತು ಗೋಳದ ಘನಫಲ $\frac{4}{3}\pi r^3$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಘನಫಲಗಳೊಳಗಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯೂ 3:2 ಆಗಿದೆ.





ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:


ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಚಿನ ಉದ್ದವೂ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಚೌಕಗಟ್ಟಿ (ಘನ)ಯಿಂದ ಕೆತ್ತಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೋಳದ ಹೊರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು? ಗೋಳದ ವ್ಯಾಸವು ಚೌಕಗಟ್ಟಿಯ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದಲ್ಲವೇ. ಆಗ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ



$$4\pi \times 16 = 64\pi \text{ ಚ.ಸೆ.ಮೀ}$$

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಮನಿಸಿರಿ:

12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಗೋಳವನ್ನು ಎರಡು ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು?



ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅರ್ಧ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಸೇರಿರುವುದಲ್ಲವೇ ಅರ್ಧಗೋಳ.

ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

$$4\pi \times 12^2 = 576\pi \text{ ಚ.ಸೆ.ಮೀ}$$

ಇದರ ಅರ್ಧ ಮತ್ತು ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೇರಿರುವುದು ಅರ್ಧಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ


$$\pi \times 12^2 = 144\pi \text{ ಚ.ಸೆ.ಮೀ}$$

ಆಗ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ


$$\frac{1}{2} \times 576\pi + 144\pi = 432\pi \text{ ಚ.ಸೆ.ಮೀ}$$

ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ:

ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭದ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿಯ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ 2.5 ಮೀಟರು ಮತ್ತು ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ 1.5 ಮೀಟರು ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರು ನೀರು ಹಿಡಿಯಬಹುದು?



$$\frac{\pi + \sqrt{5}}{2}$$



ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು

ಟ್ಯಾಂಕಿಯ ಅರ್ಧಗೋಳಾಕೃತಿಯ ಭಾಗದ ಘನಫಲ

$$\frac{2}{3}\pi \times (1.5)^3 = 2.25\pi \text{ ಘನಮೀಟರು}$$

ವೃತ್ತಸ್ತಂಭ ಭಾಗದ ಘನಫಲ

$$\pi \times (1.5)^2 (2.5 - 1.5) = 2.25\pi \text{ ಘನಮೀಟರು}$$


ಆಗ ಟ್ಯಾಂಕಿಯ ಒಟ್ಟು ಘನಫಲ

$$2.25\pi + 2.25\pi = 4.5\pi \approx 14.13 \text{ ಘನಮೀಟರು}$$

ಒಂದು ಘನಮೀಟರು ಎಂಬುದು, 1000 ಲೀಟರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಟ್ಯಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14130 ಲೀಟರು ನೀರು ಹಿಡಿಯಬಹುದು.




- (1) ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 120 ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಎರಡು ಅರ್ಧಗೋಳಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಾಗಿರುವುದು?
- (2) ಎರಡು ಗೋಳಗಳ ಘನಫಲಗಳೊಳಗಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ 27 : 64 ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳೊಳಗಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳೊಳಗಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎಷ್ಟು?
- (3) ಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭದ ಉದ್ದ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮತ್ತು ತ್ರಿಜ್ಯವು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕರಗಿಸಿ, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಎಷ್ಟು ಗೋಳಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು?
- (4) 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಲೋಹದ ಗೋಳವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಸಮಾನ ಗಾತ್ರವಿರುವ 27 ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗೋಳಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟಾಗಿರುವುದು?
- (5) 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಗೋಳದಿಂದ 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಉನ್ನತಿಯಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲವು ಗೋಳದ ಘನಫಲದ ಎಷ್ಟು ಭಾಗವಾಗಿದೆ?
- (6) ಒಂದು ಪೆಟ್ಟೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ:





ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರು ಪೆಟ್ಟೋಲ್ ಹಿಡಿಯಬಹುದು?

$$x^2 - a^2$$

$$(0, 1)$$





(7) ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಗೋಳವನ್ನು ಎರಡು ಅರ್ಧಗೋಳಗಳಾಗಿ ತುಂಡರಿಸಿ ಒಂದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರವಿರುವ ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನೂ ತುಂಡರಿಸಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳ ಘನಫಲಗಳೊಳಗಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎಷ್ಟು?




ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳದಿಂದ ಕೆತ್ತಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುವ ಅತಿದೊಡ್ಡದಾದ ಚೌಕಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾರ್ಶ್ವಮುಖಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯೇನು?


ಪುರವಲೋಕನ



ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನೆಗಳು	ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು	ಟೀಚರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು	ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
<ul style="list-style-type: none"> ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾದದ ಅಂಚು, ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂಚು, ಉನ್ನತಿ, ಪಾದದ ಕರ್ಣ ಇವುಗಳೊಳಗಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೌಕವನ್ನೂ ಸಮಪಾರ್ಶ್ವ ತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನೂ ತುಂಡರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಘನಫಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳತೆಗಳಿರುವ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೆಟ್ಟರಿನ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸ, ಉನ್ನತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ ಇವುಗಳೊಳಗಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು. ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಘನಫಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು. ಗೋಳ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಘನಫಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿರುವ ದಾರಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು. 			



$$\frac{\pi + \sqrt{5}}{2}$$




9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ಅನುಬಂಧ


ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳ ಘನಫಲ, ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಘನಫಲ ಎಂಬವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲವೇ ನೋಡಿದ್ದು. ಇವುಗಳು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದುವು ಎಂಬುದನ್ನರಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವವರಿಗಾಗಿ, ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲ

ಒಂದು ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಸರಿಸುವಾರು ರೂಪವಾಗಿ ಕೆಲವು ಚೌಕ ಚಪ್ಪಡಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು.




ಚಪ್ಪಡಿಗಳ ದಪ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುವುದಕ್ಕನುಸರಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಅಟ್ಟಿಯ ಹೊಂದಿಕೆಯು ಪಿರಮಿಡ್ಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗುವುದು.



ಆಗ ಈ ಚಪ್ಪಡಿಗಳ ಘನಫಲಗಳ ಮೊತ್ತವು ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 10 ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಪ್ಪಡಿ ಒಂದೊಂದು ಚೌಕಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ; ಇವುಗಳ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ. ಆಗ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಉನ್ನತಿ h ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಚಪ್ಪಡಿಯ ಉನ್ನತಿ $\frac{1}{10}h$ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಪ್ಪಡಿಯ ಪಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಿ?

ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಚಪ್ಪಡಿಗಳ ಅಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶೀರ್ಷದ ಮೂಲಕ ಲಂಬವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಸಿಗುವುದು:



ಮೇಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಸಮಪಾರ್ಶ್ವ ತ್ರಿಕೋನಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಬರುವುದಲ್ಲವೇ; ಇವುಗಳ ಉನ್ನತಿ ವೃದ್ಧಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಪ್ಪಡಿಯಲ್ಲೂ $\frac{1}{10}h$ ಎಂಬ ದರದಲ್ಲಾಗಿದೆ.

$$\sqrt{2}$$

$$\sqrt{3}$$

$$\sqrt{5}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{7}$$

$$\frac{1}{3}$$


$$\frac{1}{10}$$



$$x^2 - a^2$$

$$(0, 1)$$





ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸದೃಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ಕಾರಣವೇನು?) ಪಾದಗಳೂ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾದವನ್ನು b ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಮೇಲಿನಿಂದಿರುವ ತ್ರಿಕೋನಗಳ ಪಾದ $\frac{1}{10}b, \frac{2}{10}b, \dots, b$ ಎಂಬಂತಿರುವುದು.

ಆಗ ಈ ಚಪ್ಪಡಿಗಳ ಘನಫಲ

$$\left(\frac{1}{10}b\right)^2 \times \frac{1}{10}h, \left(\frac{2}{10}b\right)^2 \times \frac{1}{10}h, \dots, b^2 \times \frac{1}{10}h$$

ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು?

$$\frac{1}{10}b^2h \left(\frac{1}{10^2} + \frac{2^2}{10^2} + \dots + \frac{9^2}{10^2} + \frac{10^2}{10^2} \right) = \frac{1}{1000}b^2h(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2)$$

ಇಂತಹ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿರುವ ವಿಧಾನವನ್ನು **ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು** ಎಂಬ ಪಾಠದ **ವರ್ಗಗಳು** ಎಂಬ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ.

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 10^2 = \frac{1}{6} \times 10 \times (10 + 1) \times (2 \times 10 + 1)$$

ಆಗ ಘನಫಲಗಳ ಮೊತ್ತ

$$\frac{1}{1000}b^2h \times \frac{1}{6} \times 10 \times 11 \times 21 = \frac{1}{6}b^2h \times \frac{10}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{21}{10} = \frac{1}{6}b^2h \times 1.1 \times 2.1$$

ಇನ್ನು ಇದರಂತೆ 100 ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. (ಅದನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ).

ಚಪ್ಪಡಿಗಳ ದಪ್ಪ $\frac{1}{100}h$ ಆಗುವುದು; ಪಾದಗಳ ಅಂಚು $\frac{1}{100}b, \frac{2}{100}b, \frac{3}{100}b, \dots$ ಎಂಬೀ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಘನಫಲಗಳ ಮೊತ್ತ

$$\begin{aligned} \frac{1}{100^3}b^2h(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 100^2) &= \frac{1}{100^3}b^2h \times \frac{1}{6} \times 100 \times 101 \times 201 \\ &= \frac{1}{6}b^2h \times \frac{100}{100} \times \frac{101}{100} \times \frac{210}{100} \\ &= \frac{1}{6}b^2h \times 1.01 \times 2.01 \end{aligned}$$


ಚಪ್ಪಡಿಗಳ 1000 ಆದರೆ? ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದೆಯೇ ಘನಫಲಗಳ ಮೊತ್ತ


$$\frac{1}{6}b^2h \times 1.001 \times 2.001$$

ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಲ್ಲವೇ. ಈ ಮೊತ್ತಗಳು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಷ್ಟು ನಿಕಟವಾಗುವುದು?

ಇದುವೇ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲ. ಅಂದರೆ,

$$\frac{1}{6}b^2h \times 1 \times 2 = \frac{1}{3}b^2h$$






ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲ


ಚೌಕ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಟ್ಟು ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಸರಿಸುಮಾರು ಆಕೃತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹೊಂದಿಸಿಟ್ಟು ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಸರಿಸುಮಾರು ಆಕೃತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು:

ಇದರ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. (ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿರಿ.)




ಗೋಳದ ಹೊರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ


ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೋಳದ ಮಧ್ಯದ ಮೂಲಕವಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಭುಜಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಒಂದು ಸಮಬಹುಭುಜವನ್ನೂ ಊಹಿಸಿರಿ.



ಇನ್ನು ಈ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ, ಒಳಗೊಂಡು ಗೋಳವೂ, ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕೃತಿಯೂ ಸಿಗುವುದು;




ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಿರುವ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಎರಡು ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡ್‌ಗಳ ಪೀಠಗಳಾಗಿಯೂ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ವಿಭಜಿಸಬಹುದು:




ಸಣ್ಣದೂ ದೊಡ್ಡದೂ

ಒಂದು ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತಪಿರಮಿಡ್ ಸಿಗುವುದು.



ಸಣ್ಣ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಅಳತೆಗಳೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ?

ಪಾದದತ್ತಿಜ್ಯ, ಉನ್ನತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ ಎಂಬವುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ R, H, L ಎಂದೂ ಸಣ್ಣದರಲ್ಲಿ r, h, l ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಚಿತ್ರದಿಂದ



$$\frac{r}{R} = \frac{h}{H} = \frac{l}{L} \text{ ಎಂದು ಸಿಗುವುದು.}$$

$\sqrt{2}$

$\sqrt{3}$

$\sqrt{5}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\frac{1}{7}$


$\frac{1}{3}$

$\frac{1}{10}$





$x^2 - a^2$


$(0, 1)$



$an + b$




ಬಹುಭುಜದ ಅಂಚುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುವುದಕ್ಕನುಸರಿಸಿ, ಹೊರಗಿನ ಆಕೃತಿಯು ಗೋಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗುವುದು:




ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪೀಠ

ಒಂದು ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡನ್ನು ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದರೆ ಕೆಳಗೆ ಉಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪೀಠ (frustum of a cone) ಎಂದು ಹೆಸರು.



ಒಂದು ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪೀಠದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ವೃತ್ತಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿ (ಓರೆ ಎತ್ತರ) ತಿಳಿದಿರುವುದಾದರೆ ವಕ್ರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?




ದೊಡ್ಡ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾರ್ಶ್ವೋನ್ನತಿಗಳನ್ನು L, l ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ $d = L - l$. ಆಗ ಪೀಠದ ವಕ್ರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ,

$$\begin{aligned} \pi RL - \pi rl &= \pi(RL - rl) \\ &= \pi(R(l + d) - rl) \\ &= \pi(Rl + Rd - rl) \end{aligned}$$

ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲೇ ನೋಡಿದಂತೆ, $\frac{r}{R} = \frac{l}{L}$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, $Rl = rL$ ಎಂದು ಸಿಗುವುದು. ಆಗ ವಕ್ರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

$$\begin{aligned} \pi(rL + Rd - rl) &= \pi(r(L - l) + Rd) \\ &= \pi(rd + Rd) \\ &= \pi(r + R)d \end{aligned}$$

ಈ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳ ಪಾರ್ಶ್ವಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇದರ ಮಧ್ಯದ ಮೂಲಕವಿರುವ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ m ಎಂದೂ, ಉನ್ನತಿ h ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸುವ. ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ r ಎಂದೂ ಅದನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಭುಜದ ಅಂಚು a ಎಂದೂ ತೆಗೆದರೆ, ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಸಿಗುವುದು.



ಇದರ ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನು ಸದೃಶವಾಗಿಸಿದರೆ

$$\frac{m}{r} = \frac{h}{a}$$

ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂದರೆ,


$$am = rh$$

ಇದು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪೀಠದ ಪಾರ್ಶ್ವಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು $2\pi ma$ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಪೀಠವೂ ಸ್ತಂಭವೂ ಎಂಬ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮೇಲಿನ ಸಮವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು $2\pi rh$ ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದುವೇ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ r ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿ h ಆಗಿರುವ ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭದ ಪಾರ್ಶ್ವಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ.

ಆಗ ಸಿಕ್ಕಿದುದೇನು? ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಗೋಳದ ಸರಿಸುಮಾರು ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾರ್ಶ್ವಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಂಬುದು ಅಷ್ಟೇ ಉನ್ನತಿಯೂ, ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯದಷ್ಟೇ ತ್ರಿಜ್ಯವೂ ಇರುವ ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭದ ಪಾರ್ಶ್ವಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ.



$$\frac{\pi + \sqrt{5}}{2}$$



ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು

$$\sqrt{2}$$

$$\sqrt{3}$$

$$\sqrt{5}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{7}$$

$$\frac{3}{1}$$


$$\frac{1}{10}$$



$$x^2 - a^2$$

$$(0, 1)$$

ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸರಿಸುಮಾರು ಆಕೃತಿಯ ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ಶ್ವಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು, ಈ ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭಗಳ ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ಶ್ವಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವುದೇನು? ದೊಡ್ಡದೊಂದು ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭ:




ವೃತ್ತವನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಬಹುಭುಜದ ಅಂಚುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುವುದಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಕಟವಾಗುವುದು; ಗೋಳವನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಆಕೃತಿಯು, ಗೋಳಕ್ಕೆ ನಿಕಟವಾಗುವುದು. ಈಗ ಕಂಡಂತೆ, ಎಷ್ಟೆ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೂ ಈ ಆಕೃತಿಯ ಪಾರ್ಶ್ವಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು, ಆಗ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಅದನ್ನು ಆವರಿಸುವ ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭದ ಪಾರ್ಶ್ವಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೇ ಆಗಿದೆ. ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭದ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ r ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿ $2r$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪಾರ್ಶ್ವಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

$$2\pi \times r \times 2r = 4\pi r^2$$

ಗೋಳದ ಹೊರಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೂ ಇದುವೇ ಆಗಿದೆ.

ಗೋಳದ ಘನಫಲ


ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ:




ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಕ್ಕೂ ರಚಿಸಿದ ವೃತ್ತಗಳಿಂದ ಗೋಳವನ್ನು ಹಲವಾರು ಕೋಣೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಗೋಳದ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನಂತಿರುವ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಸಿಗುವುದು:



ಇಂತಹ ಆಕೃತಿಗಳು ಸೇರಿರುವುದೇ ಗೋಳ; ಆದುದರಿಂದ ಗೋಳದ ಘನಫಲವೆಂಬುದು ಈ ಆಕೃತಿಗಳ ಘನಫಲಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗೋಳದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು, ಗೋಳವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಚೌಕಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಗೋಳವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಸಿಗುವುದು; ಅದು ನಿಖರವಾದ ಚೌಕ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳ ಉನ್ನತಿ, ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು r ಎಂದೂ, ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ a ಎಂದೂ, ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಅದರ ಘನಫಲ $\frac{1}{3}ar$ ಎಂದೂ ಸಿಗುವುದು. ಗೋಳವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಆಕೃತಿಯು




$$an + b$$




ಪೀಠವೂ ಸ್ತಂಭವೂ


ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಪೀಠದ ಪಾರ್ಶ್ವಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $\pi(r+R)d$ ಎಂದು ತಿಳಿದೆವಲ್ಲವೇ.



ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ x ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಹೀಗೊಂದು ಚಿತ್ರ ಸಿಗುವುದು:



ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆ?



ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಸದೃಶ ತ್ರಿಕೋನಗಳಿಂದ,


$$\frac{x-r}{R-r} = \frac{1}{2}$$

ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದರೆ,

$$x = \frac{1}{2}(R+r)$$

ಎಂದು ಸಿಗುವುದು. ಅಂದರೆ, ಪೀಠದ ಪಾರ್ಶ್ವಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $2\pi xd$

ಇದು, ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ x ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿ d ಆಗಿರುವ ವೃತ್ತ ಸ್ತಂಭದ ಪಾರ್ಶ್ವಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಲ್ಲವೇ?



ಘನಫಲವು ಈ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳ ಘನಫಲಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ. ಎಲ್ಲಾ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳ ಪಾದಗಳು ಸೇರಿದರೆ, ಈ ಆಕೃತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗುವುದು. ಆಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳ ಪಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಮೊತ್ತ, ಈ ಆಕೃತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು s ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಆಕೃತಿಯ ಘನಫಲವು $\frac{1}{3}sr$ ಎಂದು ಸಿಗುವುದು.


ಗೋಳದ ಕೋಣೆಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಗೋಳವನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಆಕೃತಿಯು ಗೋಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗುವುದು; s ಎಂಬುದು, ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗುವುದು. ಅದು $4\pi r^2$ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ನೋಡಿದೆವಲ್ಲವೇ. ಆಗ ಗೋಳವನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಆಕೃತಿಯ ಘನಫಲ

$$\frac{1}{3} \times 4\pi r^2 \times r = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದು. ಇದುವೇ ಗೋಳದ ಘನಫಲವಾಗಿದೆ.




ಜ್ಯಾಮಿತಿಯು ಜೀಜಗಣಿತವು





ತ್ರಿಕೋನ ಲೆಕ್ಕಗಳು


ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯು ಯಾವುದಾದರೂ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ಶಿರಗಳಾಗುವಂತೆಯೂ, ಭುಜಗಳು ಅಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗುವಂತೆಯೂ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದೇವಲ್ಲವೆ:



ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ, ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಶಿರಗಳ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಆಯತದ ಇತರ ಎರಡು ಶಿರಗಳ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೆಂದೂ ತಿಳಿದೇವು:





ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ ಹೀಗೆ ಇರುವ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವುಗಳೊಳಗಿರುವ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವುದು. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಯತವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುವ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವುದು.



ಗಣಿತ x

ಹೀಗೆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮಾಡುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಧಾರಬಿಂದು ಮತ್ತು ಇತರ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಶಿರಗಳಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ ಈ ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:





ಇದರ ನಾಲ್ಕನೇ ಶಿರದ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ಅದಕ್ಕೆ, ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಭುಜಗಳು ಕರ್ಣಗಳಾಗುವಂತೆಯೂ ಅಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಭುಜಗಳು ಲಂಬಭುಜಗಳಾಗುವಂತೆಯೂ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ:

ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಕೋನಗಳ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿವೆ (ಕಾರಣ?). ಆದುದರಿಂದ ಅದರ ಲಂಬ ಭುಜಗಳೂ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ.

ಕೆಳಗಿನ ತ್ರಿಕೋನದ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಭುಜಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅದುವೇ ಮೇಲಿನ ತ್ರಿಕೋನದ ಲಂಬಭುಜಗಳ ಉದ್ದ.




ಇನ್ನು ಮೇಲಿನ ತ್ರಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಲಭಾಗದ ಶಿರ (9, 5) ಎಂದೂ, ಅನಂತರ ತ್ರಿಕೋನದ ಮೇಲಿನ ಶಿರ (9, 7) ಎಂದೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಲ್ಲವೆ. (ಹೇಗೆ?)


(0, 1)




an+b



(1) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶಿರದ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು?




(2) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಕೋನದ ಭುಜಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಅದರೊಳಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ:



ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಕೋನದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿರಗಳ ಸೂಚಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(3) $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಆಧಾರ ಬಿಂದುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಗಳು ಸಮೀಪ ಭುಜಗಳಾಗಿರುವ ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶಿರದ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು?




(4) ಯಾವುದೇ ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ಭುಜಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತವು ಕರ್ಣಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.


ನಿಷ್ಪತ್ತಿ



ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

$(2, 3), (8, 6)$, ಎಂಬಿವುಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಶಿರಗಳಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಗಮಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು.





ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಭಾಗ ಮಾಡುವುದಲ್ಲವೆ? ಆಗ ಕರ್ಣಗಳು ಸಂಗಮಿಸುವ ಬಿಂದುವು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.





ಇನ್ನು ಕರ್ಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಚಿಸುವ.





ಇಲ್ಲಿಯೂ ಲಂಬ ಭುಜಗಳು ಅಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಲಂಬಕೋನತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಇಡೀ ಗೆರೆಯು ಕರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನ ಮತ್ತು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು:



ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಕೋನದ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ತ್ರಿಕೋನದ ನೆಟ್ಟಗೆ ಇರುವ ಭುಜಗಳು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ತ್ರಿಕೋನಗಳ ಕೋನಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.(ಹೇಗೆ?)


ಆಗ ಈ ತ್ರಿಕೋನಗಳ ಭುಜಗಳೊಳಗಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಸಣ್ಣ ತ್ರಿಕೋನದ ಕರ್ಣವು ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಕೋನದ ಕರ್ಣದ ಅರ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಲಂಬಭುಜಗಳು ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಕೋನದ ಲಂಬ ಭುಜಗಳ ಅರ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಕೋನದ ಲಂಬಗಳ ಅಳತೆಗಳು ತಿಳಿದಿವೆ; ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ತ್ರಿಕೋನದ ಲಂಬ ಭುಜಗಳೂ ಸಿಗುವುದು:




ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಲ್ಲವೆ:





ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತುದಿ ಬಿಂದುಗಳು $(-3, 5)$, $(7, 3)$ ಆಗಿರುವ ಗೆರೆಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನೋಡಿರಿ.

ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಬಿಂದುವು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೇಲಿನ ಕರ್ಣಲೆಕ್ಕದ ಗೆರೆಯನ್ನು 1:2 ಎಂಬ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ



ರೀತಿಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು;


ಇದರಲ್ಲಿ, ರೇಖೆಯ ಭಾಗಗಳೊಳಗಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯು 1:2 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಭಾಗವು ಒಟ್ಟು ರೇಖೆಯ $\frac{1}{3}$ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಅಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ತ್ರಿಕೋನದ ಕರ್ಣವು ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಕೋನದ ಕರ್ಣದ $\frac{1}{3}$ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಸಣ್ಣ ತ್ರಿಕೋನದ ಲಂಬ ಭುಜಗಳೂ ದೊಡ್ಡ

ತ್ರಿಕೋನದ ಲಂಬಭುಜಗಳ $\frac{1}{3}$ ಭಾಗವೇ ಆಗಿರುವುದು. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೀಜಗಣಿತ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ.

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು (x, y) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ; ಆಗ ತ್ರಿಕೋನಗಳ ಭುಜಗಳ ಉದ್ದ ಹೀಗಾಗುವುದು:

ತ್ರಿಕೋನದ ಲಂಬ ಭುಜಗಳೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು:



$$\frac{x-2}{6} = \frac{y-3}{3} = \frac{1}{3}$$


ಇದರಿಂದ $\frac{x-2}{6} = \frac{1}{3}; = \frac{1}{3}$ ಎಂದೂ, ನಂತರ

$$x = 6 \times \frac{1}{3} + 2 = 4$$

$$y = 3 \times \frac{1}{3} + 3 = 4$$



ಎಂದೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಗೆರೆಯನ್ನು 1:2 ಎಂಬ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳು $(4, 4)$ ಆಗಿವೆ.





ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆಯೇ ಇಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಈ ಮೊದಲಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ.


ಗೆರೆಯ ಎರಡು ತುದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುಗಳ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ಎಂದೂ, ಗೆರೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು (x, y) ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸುವ:



ಮೊದಲು ಮಾಡಿರುವಂತೆಯೇ, ಅಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಲಂಬಭುಜಗಳಿರುವ ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ: ಇಡೀ ಗೆರೆಯು ಕರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನ ಮತ್ತು ಗೆರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನ ಮತ್ತು

ಗೆರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಕೋನ;

ಸಣ್ಣ ಕರ್ಣದ ಉದ್ದವನ್ನು p ಎಂದೂ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ಣದ ಉದ್ದವನ್ನು w ಎಂದೂ ತೆಗೆದರೆ,



ತ್ರಿಕೋನದ ಎಲ್ಲಾ ಭುಜಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಆಗ ತ್ರಿಕೋನದ ಭುಜಗಳೊಳಗಿರುವ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬರೆಯಬಹುದು:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{p}{w}$$




ಇದರಲ್ಲಿ p ಯು ಗೆರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದ ಉದ್ದವೂ, w ಇಡೀ ಗೆರೆಯ ಉದ್ದವೂ ಆಗಿದೆ; ಭಾಗಗಳೊಳಗಿರುವ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ತಿಳಿದರೆ, ಭಾಗ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಗೆರೆಗಳೊಳಗಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಆಗ $\frac{p}{w}$ ಸಿಗುವುದು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ (x, y) ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು:

$$x = x_1 + \frac{p}{w} (x_2 - x_1)$$

$$y = y_1 + \frac{p}{w} (y_2 - y_1)$$



$$\frac{\pi}{1+\sqrt{5}}$$



ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಬೀಜಗಣಿತವು

ಉದಾಹರಣೆಗೆ (2, 4), (8, 7) ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯನ್ನು 3 : 5 ಎಂಬ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ. ಇದನ್ನು (x, y) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ (2, 4) ರಿಂದ (x, y) ವರೆಗಿರುವ ಭಾಗವು ಇಡೀ ಗೆರೆಯ $\frac{3}{8}$ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಸಮವಾಕ್ಯಗಳಿಗನುಸರಿಸಿ,

$$x = 2 + \frac{3}{8} \times (8 - 2) = 4\frac{1}{4}$$

$$y = 4 + \frac{3}{8} \times (7 - 4) = 5\frac{1}{8}$$

ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಿಂದು $(4\frac{1}{4}, 5\frac{1}{8})$


ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯು ಯಾವುದಾದರೂ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, (4, 7), (10, 7) ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯು x ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದೆ (x ಅಕ್ಷದಿಂದಿರುವ ದೂರ 7) ಈ ರೇಖೆಯನ್ನು 2 : 3 ಎಂಬ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ಸೂಚಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು?

ಈ ಗೆರೆಯ ಉದ್ದ 10 - 4 = 6 ಆಗಿರುವುದು. ಆಗ 2 : 3 ಎಂಬ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೆರೆಯ ಭಾಗಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ:

$$6 \times \frac{2}{5} = 2\frac{2}{5}$$

$$6 \times \frac{3}{5} = 3\frac{3}{5}$$



ಆಗ ಈ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳು $(6\frac{2}{5}, 7)$ ಎಂದು ಸಿಗುವುದು.

ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಯಾವುದು?


ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗೆರೆಯ ಭಾಗಗಳು, ಇಡೀ ಗೆರೆಯ ಅರ್ಧವಾಗಿವೆ.

$$x^2 - a^2$$

$$(0, 1)$$



$$an + b$$



ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ $\frac{P}{w}$ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ, $\frac{1}{2}$ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

$$x = x_1 + \frac{1}{2}(x_2 - x_1) = \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$$

$$y = y_1 + \frac{1}{2}(y_2 - y_1) = \frac{1}{2}(y_1 + y_2)$$

$(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು


$$\left(\frac{1}{2}(x_1 + x_2), \frac{1}{2}(y_1 + y_2)\right)$$




- (1) A, B ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳು $(3, 2), (8, 7)$
 - i) $AP : PB = 2 : 3$ ಆಗಿರುವ P ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿನ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
 - ii) $AQ : QB = 3 : 2$ ಆಗುವ Q ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿನ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

- (2) ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಶಿರಗಳ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ $(2, 1), (5, 3), (8, 7), (4, 9)$ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
 - i) ಎಲ್ಲಾ ಭುಜಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಚತುರ್ಭುಜವು ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.
 - ii) ಈ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಚತುರ್ಭುಜವು ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.



- (3) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚತುರ್ಭುಜದ ಭುಜಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಅದರೊಳಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ:
 - i) ಸಣ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶಿರದ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
 - ii) ದೊಡ್ಡ ಚತುರ್ಭುಜದ ಇತರ ಮೂರು ಶಿರಗಳ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



- (4) ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನದ ಶಿರಗಳು $(3, 5), (9, 13), (10, 6)$ ಎಂಬವುಗಳಾಗಿವೆ. ಇದೊಂದು ಸಮಪಾರ್ಶ್ವ ತ್ರಿಕೋನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ. ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
- (5) ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನದ ಶಿರಗಳು $(-1, 5), (3, 7), (1, 1)$ ಎಂಬವುಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ತ್ರಿಕೋನದ ಮಧ್ಯಮಕೇಂದ್ರದ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



$$\frac{\pi}{1+\sqrt{5}}$$





ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಬೀಜಗಣಿತವು



(6) ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರವು (1,2) ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಬಿಂದು (3,2) ಆಗಿವೆ. ಈ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕವಿರುವ ವ್ಯಾಸದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ರಬಿಂದುವಿನ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಗೆರೆ ಅಕ್ಕ

ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಗೆರೆ (ಒಂದು ಗೆರೆ ಮಾತ್ರ) ಯನ್ನು ಎಳೆಯುವ. ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ವೃದ್ಧಿಸಬಹುದು. ಬಿಂದುಗಳ x -ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮಾನವಾದರೆ, ಗೆರೆಯು y -ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವುದು; y -ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮಾನವಾದರೆ, ಗೆರೆಯು x ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವುದು;




x -ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ y -ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದರೆ, ಗೆರೆಯು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗದೇ ಬಾಗಿಕೊಂಡಿರುವುದು:




$$(0, 1)$$




$$an+b$$



ಇಂತಹ ಬಾಗಿದ ಒಂದು ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲೂ x -ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಯೂ, y -ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಬದಲಾಗುವುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:



(2, 5), (6, 7) ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯ ಇತರ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳು $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$; ಆಗಿವೆ. ಗೆರೆಯ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಕರ್ಣಗಳಾಗುವಂತೆ ಅಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಲಂಬಭುಜಗಳಿರುವ ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತ್ರಿಕೋನಗಳ ಭುಜಗಳು ಒಂದೇ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ.



ಆಗ

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$


ಇದನ್ನು ಹೀಗೆಯೂ ಬರೆಯಬಹುದು:

$$y_2 - y_1 = \frac{1}{2}(x_2 - x_1)$$



ಇದರಲ್ಲಿ $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ಗೆರೆಯ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಾಗಬಹುದು.

(2, 5), (6, 7) ಎಂಬಿವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರೂ, ಅವುಗಳ y -ವ್ಯತ್ಯಾಸವು, x -ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅರ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಗೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ತಲುಪುವಾಗ, x - ಸೂಚಕ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ, y -ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಬದಲಾಗುವುದು: ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಇದಾಗಿದೆ.



$$\frac{\pi}{1+\sqrt{5}}$$



ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಬೀಜಗಣಿತವು

(2, 5), (6, 7) ಎಂಬಿವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ y ಯಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯು, x ನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅರ್ಧವಾಗಿರುವುದು.

(2, 5), (6, 7) ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರೋ?

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, (1, 4), (5, 12) ಎಂದು ತೆಗೆದು ನೋಡುವ. ಇವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯ ಮೂಲಕ (1, 4)ರಿಂದ (5, 12)ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಾಗ, x ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆ 4 ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು; y ಸೂಚಕ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅಂದರೆ, x ನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಎರಡು ಮಡಿ y ಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗೆರೆಯ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು:

(1, 4), (5, 12) ಎಂಬಿವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ y ಯ ಬದಲಾವಣೆಯು, x ನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಎರಡು ಮಡಿಯಾಗಿರುವುದು.

ಈ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳಲ್ಲೂ x ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ y ಯೂ ಹೆಚ್ಚುವುದು. ವಿಲೋಮ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, (3, 6), (7, 4) ಎಂಬ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, x ಸೂಚಕ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಹೆಚ್ಚುವಾಗ y ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕಡಿಮೆಯಾದುದಾಗಿದೆ; ಆಗ

(3, 6), (7, 4) ಎಂಬಿವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ y ಯ ಬದಲಾವಣೆಯು, x ನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅರ್ಧದ ಋಣವಾಗಿರುವುದು.

ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವುದೇನು?

ಅಕ್ಷಗಳೊಂದಕ್ಕೂ ಸಮಾನಾಂತರವಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ y ಸೂಚಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯು, x ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವುದಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಇರುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆಯಲ್ಲವೆ:

ಅಕ್ಷಗಳೊಂದಕ್ಕೂ ಸಮಾನಾಂತರವಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ y ಯ ಬದಲಾವಣೆಯೂ x ನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಪಾತಿಕವಾಗಿದೆ.

x ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಒಂದು ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ, y ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ y ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 0 ಆಗಿದೆ. ಇದು x ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು 0 ಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿರುವುದಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿಯೂ y ವ್ಯತ್ಯಾಸವು, x ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ x, y ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನುಪಾತಿಕವಲ್ಲ.

$$\sqrt{2}$$

$$\sqrt{3}$$

$$\sqrt{5}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{7}$$


$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{10}$$




$$x^2 - a^2$$

$$(0, 1)$$




$$an + b$$



ಗಣಿತ x

ಜ್ಯಾಮಿತೀಯವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, x ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆನ್ನುವುದು ಅಡ್ಡಕ್ಕಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ y ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನೀಟಕ್ಕಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ. ಆಗ y ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು x ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವುದು, ಅಡ್ಡಕ್ಕಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗನುಸರಿಸಿ, ನೀಟಕ್ಕಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರವಾಗಿದೆ:




ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ಗೆರೆಯ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅನುಪಾತ ಸ್ಥಿರಾಂಕವು ಗೆರೆಯ ಬಾಗುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗೆರೆಯ ಬಾಗುವಿಕೆ (Slope) ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯ ಉಳಿದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಈ ಆಶಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, (3, 5), (6, 7) ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯನ್ನು ನೋಡುವ. ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ x ಬದಲಾವಣೆ 3 ಮತ್ತು y ಬದಲಾವಣೆ 2 ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ. ಆಗ ಈ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ x ಬದಲಾವಣೆ 3 ಆಗುವಾಗ y ಬದಲಾವಣೆ 2 ಆಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಈ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ x ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆ 1 ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ, y ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆ $\frac{2}{3}$ ಬದಲಾಗುವುದು.

ಇನ್ನು (3, 5) ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿನ x ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 1 ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 4 ಮಾಡಿದರೆ? (4, 5) ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ y ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆಯುವ ಗೆರೆಯು ಮೊದಲಿನ ಗೆರೆಯನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದಲ್ಲವೆ:



ಜಿಯೋಜಿಬ್ರುದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಒಂದು ಗೆರೆಯ ಬಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು slope ಉಪಯೋಗಿಸಿ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಹೀಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ x ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 1 ಆಗಿ ತೋರಿರುವುದು. ಆಗ y ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ರೇಖೆಯ ಬಾಗುವಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು.

ಈ ಬಿಂದುವಿನ y ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? ಅದರ x ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆ 3 ರೊಂದಿಗೆ 1 ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಗ y ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗಲು 5 ರೊಂದಿಗೆ $\frac{2}{3}$ ನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ, $(4, 5\frac{2}{3})$ ಈ ರೇಖೆಯ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ x ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಈ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.




ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ x ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆ 9 ಆಗಿರುವ ಬಿಂದು ಯಾವುದು?

(0, 1)



$an+b$

$$\frac{\pi}{1+\sqrt{5}}$$




ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಬೀಜಗಣಿತವು

3 ರೊಂದಿಗೆ 6 ಕೂಡಿಸಿರುವುದೇ 9; ಆಗ y ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗಲು 5 ರೊಂದಿಗೆ $6 \times \frac{2}{3} = 4$ ನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ (9, 9) ರೇಖೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.

(3, 5), (6, 7), (9, 9) ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದೇ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದೆವಲ್ಲವೆ. ಇವುಗಳ x ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ 3, 6, 9 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ? y ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ 5, 7, 9 ರೊಳಗೇ ಹೀಗೆ ಈ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಣಿಕಾಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ?



ಎರಡು ಗೆರೆಗಳು ಸಂಗಮಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಈ ಆಶಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ (0, 2), (6, 4) ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯೂ, (3, 1), (-2, 6) ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯೂ ಸಂಗಮಿಸುವ ಬಿಂದು (x, y) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ.



ಆಗ (x, y) ಎಂಬ ಬಿಂದು ಎರಡೂ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು. x, y ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಅನುಪಾತಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮೊದಲಿನ ಗೆರೆಯಿಂದ,

$$\frac{y-2}{x-0} = \frac{4-2}{6-0}$$

ಎಂದೂ, ಎರಡನೇ ಗೆರೆಯಿಂದ

$$\frac{y-1}{x-3} = \frac{6-1}{-2-3}$$

ಎಂದೂ ಸಿಗುವುದು. ಈ ಸಮವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಲಘೂಕರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು:


$$x - 3y = -6$$

$$x + y = 4$$

ಇಂತಹ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮವಾಕ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿರುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒಂಭತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವಿರಲ್ಲವೆ. ಅದನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ x ಮತ್ತು y ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.


$$x = 1\frac{1}{2} \quad y = 2\frac{1}{2}$$

ಅಂದರೆ ಗೆರೆಗಳು ಸಂಗಮಿಸುವುದು, $(1\frac{1}{2}, 2\frac{1}{2})$ ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಾಗಿದೆ.



$$(0, 1)$$

$$an+b$$




- (1) (1, 3), (2, 5), (3, 7) ಎಂಬೀ ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದೇ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿವೆಯೆಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.
- (2) (-1, 4), (1, 2) ಎಂಬೀ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯ ಇತರ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ಸೂಚಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
- (3) x_1, x_2, x_3, \dots ಮತ್ತು y_1, y_2, y_3, \dots ಎಂಬಿವುಗಳು ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿವೆ. $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots$ ಎಂಬ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜೊತೆಗಳು ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರುವ ಬಿಂದುಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.
- (4) $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ ಎಂಬೀ ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದು ಗೆರೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ $(3x_1 + 2y_1, 3x_1 - 2y_1), (3x_2 + 2y_2, 3x_2 - 2y_2), (3x_3 + 2y_3, 3x_3 - 2y_3)$ ಎಂಬೀ ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದೇ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿರುವುವೆಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ. 3, 2 ಎಂಬೀ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಇದು ಸರಿಯಾಗುವುದೇ?

ರೂಪಗಳೂ ಸಮವಾಕ್ಯಗಳೂ

(2, 4), (5, 6) ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯ ಒಂದು ಬಿಂದು (x, y) ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ

$$\frac{y - 4}{x - 2} = \frac{6 - 4}{5 - 2} = \frac{2}{3}$$

ಎಂದು ಸಿಗುವುದಲ್ಲವೆ.



(1, 3), (5, 6) ಎಂಬೀ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲೂ (2, 4), (6, 7) ಎಂಬೀ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲೂ y ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು x ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವುದು $\frac{3}{4}$ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆಯು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಜಿಯೋಜಬ್ರದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರಿ. ಈ ಗೆರೆಗಳೊಳಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವೇನು?

ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು:

$$3(y - 4) = 2(x - 2)$$


ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಘೂಕರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು:

$$2x - 3y + 8 = 0$$

ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಈ ಗೆರೆಯ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ಅದರ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ,





(p, q) ಎಂಬ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರುವ ಬಿಂದುವು ಈ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ $2p - 3q + 8 = 0$ ಆಗಿರುವುದು


ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳು ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ ಬಿಂದು ಈ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದೇ?

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $x = 11, y = 10$ ಎಂದಾದರೆ

$$2x - 3y + 8 = 22 - 30 + 8 = 0$$

ಎಂದು ಸಿಗುವುದು. ಆಗ $(11, 10)$ ಎಂಬ ಬಿಂದು ಈ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿರುವುದೇ?

ಈ ಮೊದಲು ನೋಡಿದಂತೆ $(11, 4)$ ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ y ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ಗೆರೆಯು, ಈ ಗೆರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆ. ಈ ಬಿಂದುವಿನ x ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆ 11 ಆಗಿದೆ; y ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಯು y ಆಗಿರಲಿ;



ಚಿತ್ರದಿಂದ,

$$\frac{y-4}{11-2} = \frac{2}{3} \text{ ಎಂದು ಸಿಗುವುದು.}$$

ಇದನ್ನು ಲಘೂಕರಿಸಿದಾಗ $y = 10$ ಎಂದು ಸಿಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ $(11, 10)$ ಎಂಬ ಬಿಂದು ಈ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇನ್ನು $2p - 3q + 8 = 0$ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ p, q ಎಂಬ ಯಾವುದೋ

ಎರಡು ಜೊತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ದೊರೆತವು ಎಂದು ಊಹಿಸಿರಿ.


$(p, 4)$ ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ y ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ಗೆರೆ, $(2, 4)$,

$(5, 6)$ ಎಂಬಿವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ.

ಬಾಗುವಿಕೆಯು ಲಂಬವು

ಸಮಾನಾಂತರ ಗೆರೆಗಳ ಬಾಗುವಿಕೆಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಕಾಣಲು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳ ಬಾಗುವಿಕೆಗಳೊಳಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವೇನು?

ಬಾಗುವಿಕೆಗಳು p, q ಆಗಿರುವ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳು ಸಂಗಮಿಸುವ ಬಿಂದು (a, b) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ. ಆಗ $(a+1, b+p)$ ಎಂಬ ಬಿಂದು ಮೊದಲಿನ ಗೆರೆಯಲ್ಲೂ; $(a+1, b+q)$ ಎಂಬ ಬಿಂದು ಎರಡನೇ ಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಆಗಿವೆ. (ಕಾರಣ?)



ಗೆರೆಗಳು ಲಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ

$$(a, b), (a+1, b+p), (a+1, b+q)$$

ಎಂಬಿವು ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನದ ಶಿರಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಗೆರೆ ಕರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ತ್ರಿಕೋನದ ಲಂಬ ಭುಜಗಳ ಉದ್ದಗಳ ವರ್ಗ $p^2 + 1, q^2 + 1$ ಎಂಬಿವುಗಳೂ, ಕರ್ಣದ ಉದ್ದವು $|p - q|$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ,

$$(p^2 + 1) + (q^2 + 1) = (p - q)^2$$

ಎಂದು ಸಿಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಲಘೂಕರಿಸಿ


$$2 = -2pq$$


ಅಥವಾ

$$pq = -1$$

ಅಂದರೆ,

ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆಯ ಬಾಗುವಿಕೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ಗೆರೆಯ ಬಾಗುವಿಕೆಯ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮದ ಋಣವಾಗಿದೆ.





ಗಣಿತ x



ಜಿಯೋಜಿಬ್ರದ Input Bar ನಲ್ಲಿ $2x - 3y + 8 = 0$ ಎಂದು ಬರೆದರೆ ಈ ಸಮವಾಕ್ಯವು ಸೂಚಿಸುವ ಗೆರೆಯು ಸಿಗುವುದು. a, b, c ಎಂಬ ಮೂರು ಸ್ಲೈಡರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ $ax + by + c = 0$ ಎಂದು Input Bar ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸ್ಲೈಡರ್‌ರು ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸುಸಂಸ್ಥಿತ ಗೆರೆಗುಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ.

ಗೆರೆಯೂ (p, y) ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗಮಿಸುವುದು ಎಂದಾದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ

$$\frac{y - 4}{p - 2} = \frac{2}{3}$$

ಎಂದೂ ಸಿಗುವುದು.

$$y = \frac{2}{3}(p - 2) + 4$$

ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು $2p - 3q + 8 = 0$ ಎಂಬ ಸಮವಾಕ್ಯದಿಂದ

$$q = \frac{2}{3}(p - 2) + 4$$

ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಆಗ $y = q$, ಅಂದರೆ (p, q) ಎಂಬ ಬಿಂದು ಈ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ನೋಡಿದೆವು.?

$(2, 4), (5, 6)$ ಎಂಬೀ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆ ಬಿಂದುಗಳ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ ಸಂಖ್ಯಾಜೋಡಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳೂ, $2x - 3y + 8 = 0$ ಎಂಬ ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಖ್ಯಾಜೋಡಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳೂ ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು:

$$(2, 4), (5, 6) \text{ ಎಂಬೀ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯ ಸಮವಾಕ್ಯವು } 2x - 3y + 8 = 0$$

ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ, ಅದರ ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು.

$(0, 0), (1, 1)$ ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯ ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ. ಈ ಗೆರೆ ಒಂದು ಬಿಂದು (x, y) ಎಂದಾದರೆ,


$$\frac{y - 0}{x - 0} = \frac{1 - 0}{1 - 0}$$

ಎಂದು ಸಿಗುವುದಲ್ಲವೆ. ಇದನ್ನು ಲಘೂಕರಿಸಿ $y = x$ ಎಂದಾಗುವುದು. ಇದು ಈ ಗೆರೆಯ ಸಮವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವುದು.


ಇದರಿಂದ ಈ ಗೆರೆಯ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನ x ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು y ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದಲ್ಲವೆ.

ಗೆರೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ರೂಪಗಳಿಗೂ ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಕೇಂದ್ರ $(1, 4)$ ಎಂಬ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ತ್ರಿಜ್ಯ 2 ಆಗಿರುವ ವೃತ್ತವನ್ನು





ನೋಡುವ. ಈ ವೃತ್ತದ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿಗೂ ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರದಿಂದಿರುವ ದೂರವು 2 ಆಗಿದೆ:



ಈ ದೂರದ ವರ್ಗವು $(x - 1)^2 + (y - 4)^2$ ಆಗಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವಿರಲ್ಲವೆ. ಇದು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯದ ವರ್ಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ

$$(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 4$$

ವೃತ್ತದ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ಸಮವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವುವು; ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಸಮವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಯಾವುದೇ ಜೊತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ, ಅವುಗಳು ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ಆಗಿರುವುವು.

ಹಾಗೆ ಇದು ವೃತ್ತದ ಸಮವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ

$$x^2 + y^2 - 2x - 8y + 13 = 0$$

ಎಂದೂ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಆಗ, ಕೇಂದ್ರವು ಅಧಾರ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ತ್ರಿಜ್ಯ 1 ಆಗಿರುವ ವೃತ್ತದ ಸಮವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು?

ಈ ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆ (x, y) ಎಂದಾದರೆ, ಕೇಂದ್ರದಿಂದಿರುವ ದೂರದ ವರ್ಗ $x^2 + y^2$; ಇದು ತ್ರಿಜ್ಯದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ

$$x^2 + y^2 = 1$$

ಇದು ಈ ವೃತ್ತದ ಸಮವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ.


ಗಣಿತ ಸಮನ್ವಯ

ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಜೋಡಿಗಳಾಗಿ ಸುವ ಮೂಲಕ, ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ಬೀಜಗಣಿತ ಸಮವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿಯೂ ವಿಲೋಮ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಡೆಕಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಣಿತದ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿದ್ದ ಬೀಜಗಣಿತವನ್ನೂ, ಜ್ಯಾಮಿತಿಯನ್ನೂ ಒಂದಾಗಿ ಸುವ ಆ ರೀತಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಜ್ಯಾಮಿತಿ (Analytic Geometry) ಎಂದು ಹೆಸರು.


ಗಣಿತ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೂ, ಗಣಿತ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಇತರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನಂಟು ಮಾಡಿದ ಕಲನ(Calculus) ಎಂಬ ಗಣಿತ ಶಾಖೆಯ ಮೂಲವು ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಹೊಸ ನೋಟವಾಗಿದೆ. ಪುರೋಗತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಸಮನ್ವಯಗಳ ಮೂಲಕವಲ್ಲವೇ.



(0, 1)




an+b



- (1) (1, 2), (2, 4) ಎಂಬಿವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯ ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ x ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳು 3, 4, 5, ... ಎಂಬೀ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾದ ಎಣಿಕಾಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರುವ ಬಿಂದುಗಳ y -ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿ ಯಾವುದು?
- (2) (-1, 3), (2, 5) ಎಂಬೀ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆಯ ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (x, y) ಎಂಬ ಬಿಂದು ಈ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ, $(x+3, y+2)$ ಎಂಬ ಬಿಂದುವೂ ಈ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.
- (3) x ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ $(x, 2x+3)$ ಎಂಬ ಬಿಂದುವು (-1, 1), (2, 7) ಎಂಬೀ ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ


ಗೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.

- (4) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿರದ ಗೆರೆಯ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ x ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆ 3 ಆಗಿದೆ.
 - i) ಅದರ y ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?
 - ii) ಗೆರೆಯ ಬಾಗುವಿಕೆ ಎಷ್ಟು?






iii) ಗೆರೆಯ ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

- (5) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ $ABCD$ ಒಂದು ಚೌಕವಾಗಿದೆ. BD ಎಂಬ ಕರ್ಣದ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನ x, y ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸೋನ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.




$$\frac{\pi}{1+\sqrt{5}}$$




ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಬೀಜಗಣಿತವು



- (6) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ x, y ಅಕ್ಷಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುವುದು ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ x, y ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 3 ಆಗಿರುವುದೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿರಿ.



- (7) ಆಧಾರ ಬಿಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ತ್ರಿಜ್ಯ 5 ಆಗಿರುವ ವೃತ್ತದ ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಈ ವೃತ್ತದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎಂಟು ಬಿಂದುಗಳ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
- (8) $(0, 1), (2, 3)$ ಎಂಬ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಗೆರೆ ವ್ಯಾಸವಾದ ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಬಿಂದು (x, y) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 3 = 0$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ. ಈ ವೃತ್ತವು x ಅಕ್ಷವನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ ಬಿಂದುಗಳ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
- (9) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತದ ಸಮವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು?



ಶಿರಗಳ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳು $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ ಆಗಿರುವ ತ್ರಿಕೋನದ ಮಧ್ಯಮಕೇಂದ್ರದ ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು?



$$\sqrt{2}$$

$$\sqrt{3}$$

$$\sqrt{5}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$


$$\frac{1}{7}$$

$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{10}$$


$$x^2 - a^2$$

$$(0, 1)$$



sin cos tan

$$an + b$$




ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದ Input Bar ನಲ್ಲಿ x, y ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸಂಖ್ಯಾಜೋಡಿಗಳು ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ ಬಿಂದುಗಳು ಸೇರಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸಮವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿರಿ:

- $2x^2 + 2y^2 = 4$
- $2x^2 + 3y^2 = 4$
- $2x^2 - 3y^2 = 4$
- $2x^2 + 3y = 4$

ಪುನರವಲೋಕನ



ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನೆಗಳು	ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು	ಟೀಚರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು	ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು
<ul style="list-style-type: none"> • ಒಂದು ಗೆರೆಯ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ y ಸೂಚಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯು, x ಸೂಚಕಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಪಾತಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು. • ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಎಳೆಯುವ ಗೆರೆಯ ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು. • ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ, ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತದ ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು. 			



$p(x)$ $q(x)$ $r(x)$

ಬಹುಪದಗಳು



ಅಪವರ್ತನಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವಿರಲ್ಲವೆ.

ಬೀಜಗಣಿತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ,

x, y ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ
 $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$

ಇದರಲ್ಲಿ y ಆಗಿ ಹಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡೋಣ.

x ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದರೂ

$$x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$$

$$x^2 - 2 = (x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})$$


$$x^2 - \frac{1}{4} = \left(x + \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right)$$

$x^2 - 1, x^2 - 2, x^2 - \frac{1}{4}$ ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ 2ನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಗಳಾಗಿವೆ.

$x - 1, x + 1, x - \sqrt{2}, x + \sqrt{2}, x - \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2}$ ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಗಳಾಗಿವೆ.

ಆಗ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಎರಡನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದವನ್ನು ಎರಡು ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಎಣಿಕಾ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡು ಎಣಿಕಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆದರೆ, ಗುಣಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತನಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ $12 = 2 \times 6$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, 2, 6 ಮತ್ತು 12 ರ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಂತೆ $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, $x - 1, x + 1$ ಇವುಗಳು $x^2 - 1$ ರ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ.



ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ,

$p(x)$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವು $q(x)$ ಮತ್ತು $r(x)$ ಎಂಬೀ ಬಹುಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾದರೆ $q(x), r(x)$ ಎಂಬಿವುಗಳನ್ನು $p(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಎನ್ನುವರು.

ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ,

$$(x - 1)(x - 2) = x^2 - 2x - x + 2 = x^2 - 3x + 2$$

ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ. ಅಂದರೆ,

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$$

ಆಗ $x - 1, x - 2$ ಎಂಬೀ ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಗಳು $x^2 - 3x + 2$ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದದ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವಿದೆ:

$$p(x) = x^2 - 3x + 2 \text{ ಎಂದು ಬರೆದರೆ, } p(1) \text{ ಎಷ್ಟು?}$$

ಈಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ, $p(x)$ ನ್ನು ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯುವ;

$$p(x) = (x - 1)(x - 2)$$

ಇದರಿಂದ

$$p(1) = (1 - 1) \times (1 - 2) = 0 \times (-1) = 0$$

ಇದರಂತೆ $p(2) = 0$ ಎಂದೂ ಸಿಗಬಹುದಲ್ಲವೇ.

ಅಂದರೆ, $p(x) = 0$ ಆಗಲು, x ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1 ಮತ್ತು 2 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, $p(x) = 0$, (ಅಂದರೆ, $x^2 - 3x + 2 = 0$) ಎಂಬ ಸಮವಾಕ್ಯದ ವಸೌಲ್ಯಗಳು 1, 2 ಎಂಬೀ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. x ಆಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡರೆ $p(x) = 0$ ಸಿಗುವುದೇ?

$(x - 1)(x - 2) = 0$ ಆಗ ಬೇಕಾದರೆ $x - 1, x - 2$ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯಾಗಬೇಕಲ್ಲವೆ.


ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ;


$$(x - 1)(x - 2)(x - 3) = (x^2 - 3x + 2)(x - 3) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$

ಎಂದು ಗುಣಿಸಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ ಎಂಬ ಮೂರನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಕ್ಕೆ ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಅಪವರ್ತನಗಳು $x - 1, x - 2, x - 3$ ಎಂಬಿವುಗಳಾಗಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿಯೂ

$$p(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$$





ಬಹುಪದಗಳು

ಎಂದು ಬರೆದರೆ, ಮೊದಲ ಲೆಕ್ಕದಂತೆ,

$$p(1) = 0, p(2) = 0, p(3) = 0$$

ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದಲ್ಲವೇ.

ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ $p(x) = 0$ ಅಂದರೆ,

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$$

ಎಂಬ ಸಮವಾಕ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳು 1, 2, 3 ಎಂಬೀ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವವು ಯಾವುದು?

$x - a$ ಎಂಬ ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದವು, $p(x)$ ಎಂಬ ಬಹುಪದದ ಅಪವರ್ತನವಾದರೆ, $p(a) = 0$ ಆಗಿರುವುದು.

ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ,

$p(x)$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವನ್ನು ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ
$$p(x) = (x - a_1)(x - a_2) \dots (x - a_n)$$

ಎಂದು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, a_1, a_2, \dots, a_n ಎಂಬೀ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 $p(x) = 0$ ಎಂಬ ಸಮವಾಕ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಆಗ ಒಂದು ಬಹುಪದ ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವು ಆ ಬಹುಪದವನ್ನು ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬಡಿಸಿ ಬರೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$x^2 - 5x + 6$ ನ್ನು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ. (ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಘಾತ ಸೂಚಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?) ಆಗ,

$$x^2 - 5x + 6 = (x - a)(x - b)$$

ಎಂದು ಬರೆದು ನೋಡೋಣ. ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆದರೆ,


$$x^2 - 5x + 6 = x^2 - (a + b)x + ab$$

ಸಮವಾಕ್ಯದ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಗುಣಕಗಳು ಸಮಾನವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ,


$$a + b = 5$$
$$ab = 6$$

ಎಂದು ಲಭಿಸಬೇಕು.

ಅಂದರೆ, ಮೊತ್ತ 5 ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧ 6 ಆಗಿರುವ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.



$an + b$



ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ,

$$a = 2 \quad b = 3$$

ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಇದು ಸರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಗ $x^2 - 5x + 6$ ನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಬಹುದು;

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

ಇದರಿಂದ $x^2 - 5x + 6 = 0$ ಎಂಬ ಸಮವಾಕ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳು 2 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಇನ್ನೊಂದು ಸಮವಾಕ್ಯಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡುವ:

$$x^2 + 2x - 15 = 0$$

ಮೊದಲ ಲೆಕ್ಕದಂತೆ

$$x^2 + 2x - 15 = (x - a)(x - b) = x^2 - (a + b)x + ab$$

ಎಂದು ಬರೆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ

$$a + b = -2$$

$$ab = -15$$

ಎಂದು ಸಿಗುವುದು.

3 ಮತ್ತು 5, ಇವುಗಳು 15ರ ಅಪವರ್ತನಗಳಾಗಿವೆ. ಗುಣಲಬ್ಧವು ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದುದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಋಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. -3 ಮತ್ತು 5ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಮೊತ್ತ ಸರಿಯಾಗಲಾರದು. ಆದರೆ 3 ಮತ್ತು -5ನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡರೆ ಸರಿಯಾಗುವುದು.

$$x^2 + 2x - 15 = (x - 3)(x - (-5)) = (x - 3)(x + 5)$$

ಆಗ $x^2 + 2x - 15 = 0$ ಎಂಬ ಸಮವಾಕ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳು 3 ಮತ್ತು -5.

ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ:

$$x^2 - x - 1 = 0$$

ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಈ ಮೊದಲಿನಂತೆ

$$x^2 - x - 1 = (x - a)(x - b) = x^2 - (a + b)x + ab$$

ಎಂದು ಬರೆದರೆ,

$$a + b = 1$$

$$ab = -1$$

ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

a, b ಎಂಬವುಗಳು ಎಣಿಕಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಆಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ. ಆಗ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಊಹಿಸಿಯೂ ತಿದ್ದಿಯೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು

$\sqrt{2}$

$\sqrt{3}$

$\sqrt{5}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\frac{1}{7}$


$\frac{1}{3}$


$\frac{1}{10}$



$x^2 - a^2$

(0, 1)





ಬಹುಪದಗಳು

ನೋಡುವ.

ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಬೇಕು.

$$(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$$

ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರೆಯುವ:

$$(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$$

ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ $a + b = 1, ab = -1$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ

$$(a - b)^2 = 1^2 - 4 \times (-1) = 1 + 4 = 5$$

ಇದರಿಂದ $a - b = \pm \sqrt{5}$

ಎಂದು ಸಿಗುವುದು.

$a - b = \sqrt{5}$ ಎಂದು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡರೆ a, b ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೀಗಾಗುವುದು:

$$a + b = 1$$

$$a - b = \sqrt{5}$$

ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ತಿಳಿದಿರುವುದಾದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಲ್ಲವೇ.

$$a = \frac{1}{2} (1 + \sqrt{5}) \quad b = \frac{1}{2} (1 - \sqrt{5})$$

$a - b = -\sqrt{5}$ ಎಂದು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೋ?

$$a = \frac{1}{2} (1 - \sqrt{5}) \quad b = \frac{1}{2} (1 + \sqrt{5})$$

ಎಂದು ಸಿಗುವುದು. (ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ.) ಯಾವುದಾಗಿದ್ದರೂ,

$$x^2 - x - 1 = \left(x - \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})\right) \left(x - \frac{1}{2}(1 - \sqrt{5})\right)$$

ಎಂದು ಸಿಗುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ $x^2 - x - 1 = 0$ ಎಂಬ ಸಮವಾಕ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳು $\frac{1}{2}$


$(1 + \sqrt{5}), \frac{1}{2} (1 - \sqrt{5})$ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡುವ:


$2x^2 - 7x + 6$ ನ್ನು ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಎರಡು ಬಹುಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು?

ಮೊದಲು ಬಹುಪದವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ:

$$2x^2 - 7x + 6 = 2 \left(x^2 - \frac{7}{2}x + 3\right)$$



$an + b$



ಇನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತೆ $x^2 - \frac{7}{2}x + 3$ ನ್ನು ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಎರಡು ಬಹುಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯುವ,

$$x^2 - \frac{7}{2}x + 3 = (x - a)(x - b)$$

$$= x^2 - (a + b)x + ab$$

ಎಂದು ಬರೆದರೆ

$$a + b = \frac{7}{2}$$

$$ab = 3$$

$(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$ ಎಂಬುವುದರಿಂದ

$$(a - b)^2 = \left(\frac{7}{2}\right)^2 - 4 \times 3$$

$$= \frac{49}{4} - 12 = \frac{1}{4}$$

$$a - b = \pm \frac{1}{2}$$

$a - b = \frac{1}{2}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ,

$$a + b = \frac{7}{2}; a - b = \frac{1}{2}$$

ಇದರಿಂದ $a = 2, b = \frac{3}{2}$ ಎಂದು ಸಿಗುವುದು.

$a - b = -\frac{1}{2}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, $a = \frac{3}{2}, b = 2$ ಎಂದು ಸಿಗುವುದು. (ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ).


ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಆಗ,


$$x^2 - \frac{7}{2}x + 3 = \left(x - \frac{3}{2}\right)(x - 2)$$

$$\therefore 2x^2 - 7x + 6 = 2 \left(x - \frac{3}{2}\right)(x - 2)$$

$$= (2x - 3)(x - 2)$$

ಎಲ್ಲಾ ಬಹುಪದಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $x^2 + 1$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಇದು $x - a, x - b$ ಎಂಬೀ ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿರುವುದಾದರೆ,





$$x^2 + 1 = (x - a)(x - b) = x^2 - (a + b)x + ab$$

ಎಂದೂ, ಅದರಿಂದ

$$a + b = 0$$

$$ab = 1$$

ಎಂದು ಸಿಗಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಂತೆ a ಮತ್ತು b ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ.

$$(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab = 0 - 4 = -4$$

ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗವು ಋಣಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಲಾರದು ಅಲ್ಲವೇ? ಆಗ ಈ ಸಮವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂದರೆ, $x^2 + 1$ ನ್ನು ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.



(1) ಕೆಳಗಿರುವ ಎರಡನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಗಳನ್ನು ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ $p(x) = 0$ ಎಂಬ ಸಮವಾಕ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| i) $p(x) = x^2 - 7x + 12$ | ii) $p(x) = x^2 + 7x + 12$ |
| iii) $p(x) = x^2 - 8x + 12$ | iv) $p(x) = x^2 + 13x + 12$ |
| v) $p(x) = x^2 - 2x + 1$ | vi) $p(x) = x^2 + x - 1$ |
| vii) $p(x) = 2x^2 - 5x + 2$ | viii) $p(x) = 6x^2 - 7x + 2$ |

(2) $p(1) = 0, p(-2) = 0$ ಆಗುವಂತೆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದ $p(x)$ ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(3) $p(1 + \sqrt{3}) = 0, p(1 - \sqrt{3}) = 0$ ಆಗುವಂತೆ ಎರಡನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದ $p(x)$ ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.


(4) $p(1) = 0, p(\sqrt{2}) = 0, p(-\sqrt{2}) = 0$ ಆಗುವಂತೆ ಮೂರನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದ $p(x)$ ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.


(5) $x^2 + x + 1$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವನ್ನು ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.

ಬಹುಪದ ಶೇಷ

$x - a$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವು, $p(x)$ ಎಂಬ ಬಹುಪದದ ಅಪವರ್ತನವಾದರೆ $p(a) = 0$ ಆಗಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದೆವಲ್ಲವೆ.

ಇನ್ನು $p(x)$ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಹುಪದವನ್ನು ಮತ್ತು a ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು $p(a)$ ಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ 0 ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿರಲಿ. $x - a$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವು, $p(x)$ ಎಂಬ ಬಹುಪದದ ಅಪವರ್ತನವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ?





$x - a$ ಅಪವರ್ತನವಾದರೆ $p(a)$ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ $p(a)$ ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ $x - a$ ಅಪವರ್ತನವಲ್ಲ.

ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಕುರಿತಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೂ ಹೇಳಬಹುದು..

$p(x)$ ಎಂಬ ಬಹುಪದದಲ್ಲಿ x ನ ಬದಲು a ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ $p(a) \neq 0$ ಎಂದಾದರೆ, $x - a$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವು $p(x)$ ಎಂಬ ಬಹುಪದದ ಅಪವರ್ತನವಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $p(x) = x^2 - 3x + 3$ ರಲ್ಲಿ $a = 1$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ $p(a) = 1$ ಎಂದು ಸಿಗುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ $x - 1$ ಎಂಬ ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದವು, $p(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಆಗ,

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$$

ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವೆವು.

$$x^2 - 3x + 3 = (x - 1)(x - 2) + 1$$

ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಎಣಿಕಾಸಂಖ್ಯೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ಎಣಿಕಾಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪವರ್ತನವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಪವರ್ತನ ಮತ್ತು ಶೇಷವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯುವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 6 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯು 15 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪವರ್ತನವಲ್ಲ, ಆದರೆ

ಆಶಯವೂ ಅರ್ಥವೂ

ಹಲವು ರೀತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಎಣಿಕಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಭಿನ್ನಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನ್ನಕಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುವವು ಎಂದು ತಿಳಿದೆವು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಭೌತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ.

14 ಮಿಠಾಯಿಗಳನ್ನು, 3 ಮಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪಾಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ಇಡಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ 2 ಮಿಠಾಯಿ ಉಳಿಯುವುದು.

14 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವ ನೂಲನ್ನು 3 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದವಿರುವ 2 ಮೀಟರ್‌ನ ಒಂದು ತುಂಡು ಬಾಕಿಯಾಗುವುದು. ಇವುಗಳಿಂದ 14ನ್ನು 3ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಶೇಷ 2 ಸಿಗುವುದು ಎಂಬ ಗಣಿತ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವಾಗ -14ನ್ನು -3ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಶೇಷವೆಷ್ಟು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅರ್ಥವೇನು?

15 = (6 × 2) + 3 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

ಎಣಿಕಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಬಹುಪದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಲಬ್ಧ, ಶೇಷ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಅಂದರೆ,

$x^2 - 3x + 3 = (x - 1)(x - 2) + 1$ ಎಂಬುವುದರಲ್ಲಿ $(x - 2)$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವನ್ನು, $x^2 - 3x + 3$ ನ್ನು $x - 1$ ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಭಾಗಲಬ್ಧವೆಂದೂ 1 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ಭಾಗಾಕಾರದ ಶೇಷವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು.


ಇದರಂತೆ


$$x^2 - 3x + 1 = (x - 1)(x - 2) - 1$$

ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು; ಆಗ $x^2 - 3x + 1$ ನ್ನು $x - 1$ ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ, ಭಾಗಲಬ್ಧ $x - 2$, ಶೇಷ -1 .

ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ, ಭಾಗಲಬ್ಧವನ್ನೂ ಶೇಷವನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $x^2 - 3x - 10$ ನ್ನು $x - 2$ ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಭಾಗಲಬ್ಧ $x - a$ ಎಂದೂ ಶೇಷ b ಎಂದೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ,

$$x^2 - 3x - 10 = (x - 2)(x - a) + b$$





ಈ ಸಮವಾಕ್ಯದ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಾಕಾರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆದರೆ ಹೀಗಾಗುವುದು.

$$x^2 - 3x - 10 = x^2 - (a + 2)x + (2a + b)$$

ಇನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಣಕಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ

$$a + 2 = 3$$

$$2a + b = -10$$

ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಮವಾಕ್ಯದಿಂದ $a = 1$ ಎಂದೂ ಅದನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಮವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, $b = -12$ ಎಂದೂ ಕಾಣಬಹುದು, ಆಗ

$$x^2 - 3x - 10 = (x - 2)(x - 1) - 12$$

ಹಾಗಾದರೆ, $x^2 - 3x - 10$ ನ್ನು $x - 2$ ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ $x - 1$, ಶೇಷ -12 .

$x^2 - 3x - 10$ ನ್ನು $x - 2$ ರಿಂದ ಭಾಗಿಸುವುದರ ಬದಲು $x + 2$ ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೋ?

$$x^2 - 3x - 10 = (x + 2)(x - a) + b = x^2 - (a - 2)x + (b - 2a)$$

ಎಂದು ಬರೆದರೆ,

$$a - 2 = 3$$

$$b - 2a = -10$$

ಈ ಸಮವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ $a = 5$ ಎಂದೂ $b = 0$ ಎಂದೂ ಲಭಿಸುವುದು.

$$\text{ಆಗ } x^2 - 3x - 10 = (x + 2)(x - 5)$$

ಅಂದರೆ, $x + 2$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವು $x^2 - 3x - 10$ ಎಂಬ ಬಹುಪದದ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ; ಬೇಕಾದರೆ ಶೇಷವು ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು.

ಮೂರನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಗಳನ್ನು ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಇದರಂತೆ ಭಾಗಲಬ್ಧವನ್ನೂ ಶೇಷವನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ $x^3 - 2x^2 - x + 4$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವನ್ನು $x - 3$ ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಭಾಗಲಬ್ಧವನ್ನೂ ಶೇಷವನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.


ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಭಾಗಲಬ್ಧವನ್ನಾಗಿ $x - a$ ಎಂಬ ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದವನ್ನು ಮತ್ತು ಶೇಷವಾಗಿ b ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸರಿಯಾಗಲಾರದು. $(x - 3)(x - a) + b$ ಎಂಬ ಬಹುಪದದ ಘಾತ ಸೂಚಿ ಎರಡಲ್ಲವೇ? ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ $x^3 - 2x^2 - x + 4$ ರ ಘಾತಸೂಚಿಯು ಮೂರಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ?


ಶೇಷವೆಂದರೆ

ಶೇಷ ಎಂಬ ಅಶಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮೊದಲು ಎಣಿಕಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಅಶಯವನ್ನು ಗಣಿತಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು.

a ಎಂಬ ಎಣಿಕಾಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು b ಎಂಬ ಎಣಿಕಾ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಾಗ, ಭಾಗಲಬ್ಧ q , ಶೇಷ r ಎಂದು ಹೇಳುವುದು, ಕೆಳಗೆ ಹೇಳುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನಾಗಿದೆ:

1. $a = qb + r$ ಆಗಿರಬೇಕು.
2. q, r ಎಂಬವುಗಳು ಸೊನ್ನೆ ಅಥವಾ ಎಣಿಕಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು.
3. $r < b$ ಆಗಿರಬೇಕು.





ಹಾಗಾದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧವಾಗಿ $x^2 + ax + b$ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದವನ್ನೂ ಶೇಷವಾಗಿ c ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಬರೆದು ನೋಡುವ:

$$x^3 - 2x^2 - x + 4 = (x - 3)(x^2 + ax + b) + c$$

ಸಮವಾಕ್ಯದ ಬಲಭಾಗದ ಗುಣಾಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಬಹುದು.

$$x^3 - 2x^2 - x + 4 = x^3 + (a - 3)x^2 + (b - 3a)x + (c - 3b)$$

ಇದರಿಂದ

$$a - 3 = -2$$

$$b - 3a = -1$$

$$c - 3b = 4$$

ಶೇಷ-ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ

ಎಣಿಕಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಶೇಷದ ನಿರ್ವಚನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ:

a ಎಂಬ ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು b ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಾಗ, ಭಾಗಲಬ್ಧ q , ಶೇಷ r ಎಂದು ಹೇಳುವುದು, ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನಾಗಿದೆ:

- 1. $a = qb + r$ ಆಗಿರಬೇಕು.
- 2. q, r ಇವುಗಳ ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು.
- 3. $r = 0$ ಅಥವಾ $0 < r < |b|$ ಆಗಿರಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $-14, -3$ ಎಂಬೀ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಾಗ

- 1. $-14 = 5 \times (-3) + 1$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.
- 2. $5, 1$ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.
- 3. $0 < 1 < |-3|$ ಆಗಿದೆ.

ಆದರೆ, -14 ನ್ನು -3 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ 5 , ಶೇಷ 1 ಎಂದು ಸಿಗುವುದು.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಮವಾಕ್ಯದಿಂದ $a = 1$, ಅದನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಮವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ $b = 2$, ಅದನ್ನು ಮೂರನೇ ಸಮವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ $c = 10$ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು.

ಆದರೆ,

$$x^3 - 2x^2 - x + 4 = (x - 3)(x^2 + x + 2) + 10$$

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಹುಪದವನ್ನು $x - a$ ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಭಾಗಲಬ್ಧವನ್ನೂ ಶೇಷವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು.

$p(x)$ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಹುಪದವನ್ನು ಮತ್ತು $x - a$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ,

$$p(x) = (x - a)q(x) + b$$

ಎಂಬ ಸಮವಾಕ್ಯವು ಸರಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ $q(x)$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವನ್ನು ಮತ್ತು b ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.


ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೂ ಬರೆಯಬಹುದು.


$$p(x) - b = (x - a)q(x)$$

ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?

$p(x)$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವು $x - a$ ಎಂಬ ಬಹುಪದದ ಅಪವರ್ತಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಅಪವರ್ತಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ $x^3 - 2x^2 + x + 2$ ಎಂಬ ಬಹುಪದದಿಂದ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದರೆ $x - 3$ ರ ಅಪವರ್ತಕವಾಗುವುದೆಂದು ನೋಡುವ.





ಬಹುಪದಗಳು

ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತೆ

$$x^3 - 2x^2 + x + 2 = (x - 3)(x^2 + ax + b) + c$$

ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು

$$x^3 - 2x^2 + x + 2 - c = (x - 3)(x^2 + ax + b)$$

ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದಲ್ಲವೇ. ಅಂದರೆ $x^3 - 2x^2 + x + 2$ ರಿಂದ c ಯನ್ನು ಕಳೆದರೆ, $x - 3$ ರ ಅಪವರ್ತನವಾಗುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯು c ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಮೊದಲು a , ನಂತರ b , ಕೊನೆಗೆ c ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ. c ಯನ್ನೂ ನೇರವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಸುಲಭ ದಾರಿಯಿದೆ. ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿರಿ. x ಗೆ ಬದಲು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡರೂ ಸಮವಾಕ್ಯದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮಾನವಾಗಬೇಕು.

ಬಲಬದಿಯನ್ನು ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿಸಿದರೋ?

ಅದಕ್ಕೆ $x = 3$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಲದೆ?

$$3^3 - (2 \times 3^2) + 3 + 2 - c = (3 - 3) \times (x^2 + a \times 3 + b) = 0$$

ಇದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವಾಗ,

$$14 - c = 0$$
$$c = 14$$

ಆಗ $x^3 - 2x^2 + x + 2$ ಎಂಬ ಬಹುಪದದಿಂದ 14 ನ್ನು ಕಳೆದರೆ $x - 3$ ರ ಅಪವರ್ತನವಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ, $x^3 - 2x^2 + x - 12$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವು, $x - 3$ ರ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಬಹುಪದವನ್ನು $x - a$ ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದದಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಾಗ ಸಿಗುವ ಶೇಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ $x^4 + 2x^3 - 6x^2 + x + 5$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವನ್ನು $x - 2$ ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ಶೇಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೆಂದು ನೋಡುವ. ಭಾಗಲಬ್ಧವು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು $q(x)$ ಎಂದೇ ಬರೆಯಬಹುದು. ಶೇಷವನ್ನು b ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ,

$$x^4 + 2x^3 - 6x^2 + x + 5 = (x - 2)q(x) + b$$

b ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಮವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರೆಯೋಣ.

$$b = (x^4 + 2x^3 - 6x^2 + x + 5) - (x - 2)q(x)$$

ಇದರಲ್ಲಿ $x = 2$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ

$$b = (2^4 + (2 \times 2^3) - (6 \times 2^2) + 2 + 5) - (2 - 2) \times q(2) = 15$$


ಎಂದು ಸಿಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಶೇಷ 15 .

ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರೆದು ನೋಡುವ. $p(x)$ ನ್ನು $x - a$ ಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಶೇಷವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು

$$p(x) = (x - a)q(x) + b \text{ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.}$$



$an + b$



ಇನ್ನು ಸಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರೆಯೋಣ.

$$b = p(x) - (x - a) q(x)$$

ಇದರಲ್ಲಿ $x = a$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ,

$$b = p(a) - (a - a) (q(a)) = p(a)$$

ಎಂದು ಸಿಗುವುದು. ಅಂದರೆ,

$p(x)$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವನ್ನು $x - a$ ಎಂಬ ಬಹುಪದದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ಶೇಷವು $p(a)$ ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

$x^3 - 2x^2 - 4x + 5$ ನ್ನು $x + 2$ ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಲಭಿಸುವ ಶೇಷವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು, ಮೊದಲು $x + 2 = x - (-2)$ ಎಂದು ಬರೆಯುವ.

$$2x - 1 = 2 \left(x - \frac{1}{2} \right)$$

ಎಂದು ಬರೆಯುವ. ಇನ್ನು $x^3 - 2x^2 - 4x + 5$ ನ್ನು $x - \frac{1}{2}$ ದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ಶೇಷವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಮೊದಲ ಬಹುಪದದಲ್ಲಿ $x = \frac{1}{2}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 - \left(2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2\right) - \left(4 \times \frac{1}{2}\right) + 5 = \frac{1}{8} - \frac{1}{2} - 2 + 5 = 2\frac{5}{8}$$

$x^3 - 2x^2 - 4x + 5$ ನ್ನು $x - \frac{1}{2}$ ದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಶೇಷವು $2\frac{5}{8}$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ,


$$x^3 - 2x^2 - 4x + 5 = \left(x - \frac{1}{2}\right) q(x) + 2\frac{5}{8}$$

ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬರೆಯುವ




$$x^3 - 2x^2 - 4x + 5 = \frac{1}{2} (2x - 1) q(x) + 2\frac{5}{8}$$

ಇನ್ನು $\frac{1}{2} q(x)$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವನ್ನು $r(x)$ ಎಂದು ಬರೆದರೆ, ಇದು ಹೀಗಾಗುವುದು

$$x^3 - 2x^2 - 4x + 5 = (2x - 1) r(x) + 2\frac{5}{8}$$



$$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$



ಬಹುಪದಗಳು

ಅಂದರೆ, $x^3 - 2x^2 - 4x + 5$ ನ್ನು $2x - 1$ ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ಶೇಷ $2\frac{5}{8}$

ಆಗಿರುವುದು.

ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಒಂದು ಬಹುಪದವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಪದದ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆಯೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲೂ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ತತ್ವವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಶೇಷವು ಸೊನ್ನೆಯಾದರೆ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುವುದಲ್ಲವೇ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಕ್ಕನುಸಾರಿ $p(x)$ ನ್ನು $x - a$ ಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಶೇಷ $p(a)$ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ $p(a) = 0$ ಆದರೆ $x - a$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವು $p(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುವುದು.

$p(x)$ ಎಂಬ ಬಹುಪದದಲ್ಲಿ x ಗೆ ಬದಲು a ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ $p(a) = 0$ ಆಗುವುದಾದರೆ $x - a$ ಎಂಬ ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದವು, $p(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುವುದು.

$x - a$ ಎಂಬ ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದವು $p(x)$ ಎಂಬ ಬಹುಪದದ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುವುದಾದರೆ $p(a) = 0$ ಆಗಿರುವುದೆಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಂಡಿರುವೆವಲ್ಲವೇ. ಈಗ ಆ ತತ್ವದ ವಿಲೋಮ ತತ್ವವೂ ಆಯಿತು.



$p(x)$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವನ್ನು $ax - b$ ಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಾಗ ಸಿಗುವ ಶೇಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು? $ax - b$ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆಯೋ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೋಧಿಸಬಹುದು?



(1) ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಬಹುಪದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೊದಲನೆ ಬಹುಪದವು ಎರಡನೇ ಬಹುಪದದ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೋಧಿಸಿರಿ. ಅಪವರ್ತನವಲ್ಲವಾದರೆ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಶೇಷವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.


- i) $x - 1, x^3 + 4x^2 - 3x - 6$ ii) $x + 1, x^3 + 4x^2 - 3x - 6$
iii) $x - 2, x^3 + 3x^2 - 4x - 12$ iv) $x + 2, x^3 + 3x^2 - 4x - 12$
v) $2x - 1, 2x^3 - x^2 - 8x + 6$ vi) $3x - 1, 3x^3 - 10x^2 + 9x - 2$

(2) ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಬಹುಪದಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದನೇ ಬಹುಪದವನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಹುಪದದಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಾಗ ಸಿಗುವ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಶೇಷವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರಿ.

- i) $x^3 - 1, x - 1$ ii) $x^3 - 1, x + 1$
iii) $x^3 + 1, x - 1$ iv) $x^3 + 1, x + 1$

(3) $p(x) = x^3 + x^2 + x$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ $q(x)$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

- i) $x - 1$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವು $q(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕೂಡಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಾಗಿರಬೇಕು?
ii) $x + 1$ ಎಂಬ ಬಹುಪದವು $q(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕೂಡಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಾಗಿರಬೇಕು?



$an + b$

$(0, 1)$

$$x^2 - a^2$$



$$\frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{3}$$


$$\frac{1}{7}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sqrt{5}$$

$$\sqrt{3}$$

$$\sqrt{2}$$



- (4) ಕೆಳಗೆಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಬಹುಪದಗಳಲ್ಲೂ n ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಣಿಕಾಸಂಖ್ಯೆಯಾದರೆ ಮೊದಲ ಬಹುಪದವು ಎರಡನೇ ಬಹುಪದದ ಅಪವರ್ತನವಾಗುವುದೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
- i) $x - 1, x^n - 1$ ii) $x - 1, x^n + 1$ iii) $x + 1, x^n - 1$
 iv) $x + 1, x^n + 1$ v) $x^2 - 1, x^n - 1$
- (5) $ax^3 + bx^2 + cx + d$ ಎಂಬ ಬಹುಪದದ ಅಪವರ್ತನವು $x^2 - 1$ ಆದರೆ $a = -c$; $b = -d$ ಆಗಿರುವುದೆಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.
- (6) $2x^3 - 3x^2 + 5x + 1$ ರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ, ಮೊತ್ತವು $x^2 - 1$ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುವ ಬಹುಪದವಾಗುವುದು?




$x^2 - 4$ ರ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುವ ಮೂರನೇ ಘಾತದ ಒಂದು ಬಹುಪದದ ಸಂಖ್ಯಾಗುಣಕಗಳೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು? $x^2 - 4$ ರ ಬದಲು $x^2 - 9$ ಆದರೋ?

ಪುನರವಲೋಕನ



ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನೆಗಳು	ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು	ಟೀಚರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು	ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
<ul style="list-style-type: none"> ಎರಡನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಗಳನ್ನು ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು. ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಎರಡನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. $x - a, x + a$ ಎಂಬಿವುಗಳು $p(x)$ ನ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿದೆಯೋ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿರುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು. ಒಂದು ಬಹುಪದವನ್ನು ಒಂದನೇ ಘಾತದ ಬಹುಪದದಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಾಗ ಸಿಗುವ ಶೇಷವನ್ನು ನೋಡದೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು 			



ನ್ಯಾಯಾನ್ವಿತ

ಸರಿಯಲ್ಲದ ಸರಾಸರಿ

ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 10 ಕುಟುಂಬಗಳ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವು ಈ ರೀತಿಯಿದೆ.

16500 21700 18600 21050 19500
17000 21000 18000 22000 17500

ಈ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯಮಾನ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ?

ಆದಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ, 10 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಮಧ್ಯಮಾನ 19285 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಸಿಗುವುದು.


ಇನ್ನು ಈ ಹತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ಮಧ್ಯಮಾನ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು;

- ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 19285 ರೂಪಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವು ರೂಪಾಯಿ 19285ಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ.
- 19285 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಸಮಾನ.

ಇವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ 175000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವಿರುವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಕೂಡಾ ಇದೆ ಎಂದಿರಲಿ. ಈಗ 11 ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯಮಾನ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಾಯಿತು?

$$\frac{(19285 \times 10) + 175000}{11} \approx 33441 \text{ ರೂಪಾಯಿ}$$

ಇನ್ನು ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದನ್ನೂ ಹೇಳದೆ, ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಧ್ಯಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 30000 ರೂಪಾಯಿಯೆಂಬ



ತಪ್ಪಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದಲ್ಲವೇ? ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹತ್ತೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯದ ಒಂದೂವರೆ ಮಡಿಯ ಹತ್ತಿರವಿದೆ.

ಮಧ್ಯಮಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು ಎಂಬುದಲ್ಲವೇ. ಆದರೆ ಗುಂಪಿನ ಇತರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ತೀರಾ ಸಣ್ಣದೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದೋ ಆಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು (ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ) ಮಧ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವವು.

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಧ್ಯಮಾನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಸಣ್ಣದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮಧ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿಸುವ ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೇ?

ಇನ್ನೊಂದು ಸರಾಸರಿ

ನಾವು ನೋಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ 11 ಕುಟುಂಬಗಳ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯದ ಕುರಿತಾದ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಆದಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆದು, ಮಧ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, 5 ಕುಟುಂಬಗಳ ಆದಾಯ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯೂ ಉಳಿದ 5 ಕುಟುಂಬಗಳ ಆದಾಯವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವೂ ಆಗಿರುವುದಲ್ಲವೇ.


ಮೊದಲು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆಯುವ.
16500, 17000, 17500, 18000, 18600, 19500, 21000, 21050, 21700, 22000, 175000


ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ 19500. ಇದನ್ನು ಈ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯಮ (median) ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಅಂದರೆ, ಈ 11 ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಧ್ಯಮ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವು 19500 ರೂಪಾಯಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಒಟ್ಟು ಇರುವ 11 ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕುಟುಂಬಗಳ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವು 19500ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು 5 ಕುಟುಂಬಗಳ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವು 19500ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಆಗಿವೆ, ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಆದಾಯವಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬವುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿವೆ.

ಇನ್ನು ಮೊದಲ 10 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೇ? ಅವರ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆದರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬದಲು, 18600, 19500 ಎಂಬೀ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದು.

ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಎಣಿಕೆಯು ಸಮಾನವಾಗುವ ವಿಧದಲ್ಲಾಗಿದೆ. 18600 ಮತ್ತು 19500ಗಳ ಎಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ ಇದು ಸರಿಯಾಗುವುದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತದ ಅರ್ಧವನ್ನು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ





ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಮೊದಲ 10 ಕುಟುಂಬಗಳ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯದ ಮಧ್ಯಮವು $\frac{1}{2} (18600 + 19500) = 19050$

ಮಧ್ಯಮವಾದ 19050 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬುದು, ಮಧ್ಯಮಾನವಾದ 19285 ರಂತೆಯೇ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲವೇ. (ಮಧ್ಯಮಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮಗಳೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ).



ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಅಧಿಕ ಆದಾಯವು ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಆದಾಯದ ಮಧ್ಯಮವು 19050 ರೂಪಾಯಿ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ 21000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವು ಈಗ ಹೇಳಿದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

- (1) ಲಾಂಗ್‌ಜಂಪ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜಿಗಿದ ದೂರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 6.10, 6.20, 6.18, 6.20, 6.25, 6.21, 6.15, 6.10
- ದೂರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮೀಟರಿನಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅವುಗಳೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?
- (2) ಕೇರಳದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2015 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.



ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (ಮಿ.ಮೀ)
ಕಾಸರಗೋಡು	66.7
ಕಣ್ಣೂರು	56.9
ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್	33.5
ವಯನಾಡ್	20.5
ಮಲಪ್ಪುರಂ	13.5
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್	56.9
ತ್ರಿಶೂರು	53.4
ಎರ್ನಾಕುಲಂ	70.6
ಕೋಟ್ಟಯಂ	50.3
ಇಡುಕ್ಕಿ	30.5
ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ	56.4
ಆಲಪ್ಪುಳ	45.5
ಕೊಲ್ಲಂ	56.3
ತಿರುವನಂತಪುರ	89.0





ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯ ಮಧ್ಯಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಮಧ್ಯಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಧ್ಯಮವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
 (3) ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯಮವೂ ಮಧ್ಯಮಾನವೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಸಾಧಿಸಿರಿ.

ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಮಧ್ಯಮವೂ


ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಡೆಸಿ ಲೀಟರಿನಲ್ಲಿ(ಅಂದರೆ 100 ಮಿಲ್ಲಿಲೀಟರ್) ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಂ ಎಂಬ ಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವರು. 25 ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನನುಸರಿಸಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣ (ಗ್ರಾಂ/ ಡೆಲೀ)	ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ
12.0	2
12.4	3
12.7	5
13.1	6
13.3	4
13.6	3
14.0	2

ಇದರಿಂದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು?

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಮಧ್ಯಮ; ಅಂದರೆ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ 25 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 12 ಮಕ್ಕಳ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣ ಮಧ್ಯಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬೇಕು; 12 ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಹೆಚ್ಚೂ ಆಗಿರಬೇಕು.

ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು, ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹದಿಮೂರನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿರಿ.




ಮೊದಲ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ 12, ನಂತರ 3 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 12.4 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು.



Mathematical symbols on the left margin: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{10}$

Large numbers on the right margin: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

Mathematical symbols at the bottom left: $x^2 - a^2$, $(0, 1)$



an+b




ಸಾಟಿಸಿಸ್ಕೆ

ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು 13ನೆಯ ಮಗುವಿನ ಅಳತೆಯಲ್ಲವೇ; ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುತ್ತಾ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಿನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಗುಂಪಿನ $2 + 3 = 5$ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಅಳತೆ 12.4 ವರೆಗೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ, 5ನೇ ಮಗುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಿನ ಪ್ರಮಾಣ 12.4.

ಪುನಃ ಮುಂದಿನ ಗುಂಪಿನ 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿದರೆ $5 + 5 = 10$ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಆಯಿತು. ಪ್ರಮಾಣ 12.7 ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವುದು.




ಆದರೆ 10ನೇ ಮಗುವಿನ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಿನ ಪ್ರಮಾಣ 12.7 ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ 6 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಕೂಡಿಸಿದರೆ $10 + 6 = 16$ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು 13 ನೆಯ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 11 ರಿಂದ



16 ವರೆಗಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಿನ ಪ್ರಮಾಣ 13.1 ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ, ಆಗ 13ನೆಯ ಮಗುವಿನ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಿನ ಪ್ರಮಾಣವೂ 13.1 ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದುವೇ ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ.





ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಗ್ರಾಂ/ಡೆಲೀ)	ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ
12.0 ವರೆಗೆ	2
12.4 ವರೆಗೆ	5
12.7 ವರೆಗೆ	10
13.1 ವರೆಗೆ	16
13.3 ವರೆಗೆ	20
13.6 ವರೆಗೆ	23
14.0 ವರೆಗೆ	25

ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 11 ರಿಂದ 16ವರೆಗಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಿನ ಪ್ರಮಾಣ

$\sqrt{2}$
 $\sqrt{3}$
 $\sqrt{5}$
 $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 $\frac{1}{7}$
 $\frac{1}{3}$
 $\frac{1}{10}$
 $x^2 - a^2$
 $(0, 1)$

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0





13.1 ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ 13ನೆಯವನೂ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮಧ್ಯಮವು 13.1 ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು.



(1) ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ 35 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ:



ತಿಂಗಳ ಆದಾಯ (ರೂಪಾಯಿ)	ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
4000	3
5000	7
6000	8
7000	5
8000	5
9000	4
10000	3


ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.


(2) ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಿನಗೂಲಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ದಿನಗೂಲಿ (ರೂಪಾಯಿ)	ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ
400	2
500	4
600	5
700	7
800	5
900	4
1000	3

ದಿನಗೂಲಿಯ ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(3) ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಭಾರಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.





ಶಿಶುಗಳ ಭಾರ (ಕಿ.ಗ್ರಾಂ)	ಶಿಶುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
2.500	4
2.600	6
2.750	8
2.800	10
3.000	12
3.150	10
3.250	8
3.300	7
3.500	5

ಭಾರದ ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರಿ.

ಕ್ಲಾಸು ಅಂತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ

ಒಂದು ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಎತ್ತರಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.


ಎತ್ತರ (ಸೆ.ಮೀ)	ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ
135 - 140	5
140 - 145	8
145 - 150	12
150 - 155	11
155 - 160	5
160 - 165	4
ಒಟ್ಟು	45

ಈ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತರದ ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಿರಿ?

ಎತ್ತರದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಗುವಿನ ಎತ್ತರವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 45 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 23ನೆಯ ಮಗು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು.

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ 23ನೆಯ ಮಗು ಇರುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ. ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಾಗ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿರುವರೆಂದು ನೋಡುವ.






ಎತ್ತರ	ಸಂಖ್ಯೆ
140 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	5
145 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	13
150 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	25
155 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	36
160 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	41
165 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	45

ಪಟ್ಟಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ 145 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ವರೆಗೆ ಎತ್ತರವಿರುವವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಸಾಲಿನ 13ನೆ ಮಗುವಿನವರೆಗೆ ಆಯಿತು. 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಎತ್ತರವಿರುವವನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ 25ನೆಯ ಮಗುವಿನವರೆಗಾಯಿತು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ 23ನೆಯವನು ಇರುವನಲ್ಲವೇ. ಆಗ ಇವನ ಎತ್ತರ 145 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿನ ಎಡೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು.

ಎತ್ತರವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

14ನೆಯ ಮಗುವಿನಿಂದ 25ನೆಯ ಮಗುವಿನ ವರೆಗಿರುವ 12 ಮಂದಿಯ ಎತ್ತರ 145 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳ ಎಡೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಎಂದಲ್ಲದೆ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಎತ್ತರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ.

ಆಗ ಕೆಲವು ಊಹೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿ ಬರುವುದು. (ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತರದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಮಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲೂ ಕೆಲವು ಊಹೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲವೇ) 145 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿನಿಂದ 150 ರವರೆಗಿನ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರನ್ನು 12 ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ಮಗುವಿನಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ.






ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತರದಲ್ಲೂ ಮಗುವಿನ ಎತ್ತರವು ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಉಪವಿಭಾಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರುವುದೆಂದೂ ಊಹಿಸುವ.

ಆಗ 14 ನೆಯ ಮಗುವಿನ ಎತ್ತರ


145 ರ ಮತ್ತು $145 \frac{5}{12}$ ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ, $145 \frac{5}{24}$ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್.

ಮುಂದಿನ ಮಗುವಿನ ಎತ್ತರವೋ?





$145 \frac{5}{12}$ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು $145 \frac{10}{12}$ ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿನ ನಡುವೆ, ಅಂದರೆ $145 \frac{15}{12}$ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್.



ಅನಂತರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಎತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ? ಎತ್ತರವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಪ್ರಮಾಣವೇನು? ಈವರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡುವ.

- 14 ನೆಯ ಮಗುವಿನ ಎತ್ತರ $145 \frac{5}{12}$
- ನಂತರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಎತ್ತರ $\frac{5}{12}$ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ನಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
- 14 ನೆಯ ಮಗುವಿನಿಂದ 23ನೆಯ ಮಗುವಿಗೆ ತಲಪುವಾಗ ಒಟ್ಟು 9 ಮಕ್ಕಳು.

ಆಗ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಾಯಿತಲ್ಲವೇ?

14 ನೆಯ ಪದ $145 \frac{5}{12}$ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ $\frac{5}{12}$ ಆಗಿರುವ ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ 23ನೆಯ ಪದವೆಷ್ಟು?


23ನೆಯ ಮಗುವಿನ ಎತ್ತರ


$$145 \frac{5}{12} + \left(9 \times \frac{5}{12}\right) = 145 + \frac{95}{12} = 148 \frac{23}{12} \approx 148.9 \text{ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ.}$$

ಚಿತ್ರವೇನನ್ನೂ ರಚಿಸದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡುವ.

ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಾಯಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಯ	ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ
25 -- 30	6
30 - 35	8
35 - 40	12
40 - 45	20
45 - 50	16
50 - 55	6
ಒಟ್ಟು	68





ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 68 ಎಂಬ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಮೀಕರಿಸಿ, 34, 35 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವವರ ಪ್ರಾಯಗಳ ಮೊತ್ತದ ಅರ್ಧವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವ.

ಪ್ರಾಯ	ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ
30 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ	6
35 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ	14
40 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ	26
45 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ	46
50 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ	62
55 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ	68

ಇದಕ್ಕನುಸರಿಸಿ, ಪ್ರಾಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 27ರಿಂದ 46ರವರೆಗಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವ 20 ಮಂದಿ, 40 ಕ್ಕೂ 45ಕ್ಕೂ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯವಿರುವವರಾಗಿರುವರು. ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 34 ಮತ್ತು 35ನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರೂ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವರಲ್ಲವೇ.


ಈ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ 40ರಿಂದ 45ರವರೆಗಿನ 5ವರ್ಷವನ್ನು 20 ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ತಲಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಂತೆ ಎಂದೂ, ಅಂತಹ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಾಯವು ಉಪವಿಭಾಗದ ನಡುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದೆಂದೂ ಭಾವಿಸುವ. ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪವಿಭಾಗದ ಗಾತ್ರ $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$ ವರ್ಷ.



ಇದಕ್ಕನುಸರಿಸಿ 27 ನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಯ 40 ವರ್ಷ ಮತ್ತು $40\frac{1}{4}$ ವರ್ಷದ ನಡುವೆ; ಅಂದರೆ $40\frac{1}{8}$ ವರ್ಷ. ಅನಂತರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಯ $\frac{1}{4}$ ವರ್ಷದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಎಂದು ಬಾವಿಸಿದರೆ 34ನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರ ಪ್ರಾಯ

$$40\frac{1}{8} + \left(7 \times \frac{1}{4}\right) = 40 + \frac{15}{8} = 41\frac{7}{8} \text{ ವರ್ಷ}$$

35 ನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರ ಪ್ರಾಯ

$$41\frac{7}{8} + \frac{1}{4} = 42\frac{1}{8} \text{ ವರ್ಷ}$$





ಸಾಟಿಸಿಕ್ಸ್

ಪ್ರಾಯದ ಮಧ್ಯಮ ಸಿಗಲು ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಯಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು.

$$\frac{1}{2} \left(41\frac{7}{8} + 42\frac{1}{8} \right) = \frac{1}{2} \times 84 = 42$$

ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಯದ ಮಧ್ಯಮ 42 ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು.



(1) ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.


ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಬಳಕೆ (ಯೂನಿಟ್)	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
80 – 90	3
90 – 100	6
100 – 110	5
110 – 120	8
120 – 130	9
130 – 140	4


ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಬಳಕೆಯ ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(2) ಒಂದು ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದ ಮಾರ್ಕುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಕು	ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ
0 – 10	4
10 – 20	10
20 – 30	12
30 – 40	9
40 – 50	5

ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.





(3) ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪಾವತಿಸಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.


ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (ರೂಪಾಯಿ)	ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1000 – 2000	8
2000 – 3000	10
3000 – 4000	15
4000 – 5000	18
5000 – 6000	22
6000 – 7000	8
7000 – 8000	6
8000 – 9000	3

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.


ಪುನರಾವಲೋಕನ



ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನೆಗಳು	ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು	ಟೀಚರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು	ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
<ul style="list-style-type: none"> ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಿಸಲು ಮಧ್ಯಮಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಳತೆಗಳ ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿರುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು. ಆವೃತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು. 			



$$\frac{\pi + \sqrt{5}}{2}$$



ಟಿಪ್ಪಣಿ

A large rectangular area with horizontal lines for writing notes.

$$\sqrt{2}$$
$$\sqrt{3}$$
$$\sqrt{5}$$
$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{7}$$
$$\frac{1}{3}$$
$$\frac{1}{10}$$



$$x^2 - a^2$$


$$(0, 1)$$



$$an + b$$

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

$$\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$



ಟಿಪ್ಪಣಿ

A large rectangular area with horizontal lines for writing notes.

$\sqrt{2}$
 $\sqrt{3}$
 $\sqrt{5}$
 $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 $\frac{1}{7}$
 $\frac{1}{3}$
 $\frac{1}{10}$
 $x^2 - a^2$


9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

$(0, 1)$



$an + b$

$$\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$



ಟಿಪ್ಪಣಿ

A large rectangular area with horizontal lines for writing notes.

$$\sqrt{2}$$

$$\sqrt{3}$$

$$\sqrt{5}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{7}$$

$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{10}$$



$$x^2 - a^2$$

$$(0, 1)$$

9

8

7

6

5


4

3

2


1

0



$$an + b$$

$$\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$



ಟಿಪ್ಪಣಿ

A large rectangular area with horizontal lines for writing notes.

$\sqrt{2}$

$\sqrt{3}$

$\sqrt{5}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\frac{1}{7}$


$\frac{1}{3}$

$\frac{1}{10}$



$x^2 - a^2$


$(0, 1)$



$an + b$

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

$$\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$



ಟಿಪ್ಪಣಿ

A large rectangular area with horizontal lines for writing notes.

$$\sqrt{2}$$
$$\sqrt{3}$$
$$\sqrt{5}$$
$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$


$$\frac{1}{7}$$
$$\frac{1}{3}$$
$$\frac{1}{10}$$



$$x^2 - a^2$$


$$(0, 1)$$

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0



$$an + b$$

$$\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$




ಟಿಪ್ಪಣಿ

A large rectangular area with horizontal lines for writing notes.

$\sqrt{2}$
 $\sqrt{3}$
 $\sqrt{5}$
 $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 $\frac{1}{7}$
 $\frac{1}{3}$
 $\frac{1}{10}$
 $x^2 - a^2$

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

$(0, 1)$



$an + b$